



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Talimogene Laherparepvec

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Imlygic

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения определенного типа рака кожи (меланомы).

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас имеется или когда-либо было любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: ослабленная иммунная система или заболевание, ослабляющее иммунную систему, например лейкоз, лимфома, ВИЧ или СПИД.
- Если Вы принимаете какой-либо из лекарственных препаратов, подавляющих функцию иммунной системы. Существует много лекарственных препаратов, которые могут оказывать такое

воздействие. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

- Если Вы беременны или можете забеременеть. Не применяйте данный лекарственный препарат во время беременности.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- На обработанный препаратом участок кожи следует наложить воздухо- и водонепроницаемую повязку, которую следует носить не менее 1 недели после каждого нанесения препарата. Оставьте повязку на более длительный период времени, если обработанный участок мокнет, или из него еще сочатся выделения. Если повязка спадет, сразу же наложите чистую повязку.
- Вам необходимо будет проявлять особую осторожность при обращении с использованными повязками, перчатками и материалами для обработки кожи и их утилизации. Эти материалы следует выбрасывать с бытовыми отходами в запечатанном полиэтиленовом пакете. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при возникновении вопросов по обращению с такими

материалами.

- Не позволяйте беременным, новорожденным или близким родственникам, таким как члены семьи, лица, осуществляющие уход, сексуальные партнеры или лица, с которыми вы делите одну кровать, контактировать непосредственно с обработанным участком кожи или повязками. Не позволяйте им прикасаться к физиологическим жидкостям. Во время половых сношений используйте презерватив. Избегайте поцелуев, если у одного из партнеров имеется открытая язва во рту.
- Одевайте перчатки при наложении или смене повязок.
- Беременным или лицам со слабой иммунной системой нельзя менять повязки или обрабатывать участок кожи, на который нанесен лекарственный препарат.
- Если кто-либо еще прикоснется к этому лекарственному препарату, обработанному участку кожи, повязкам или физиологическим жидкостям, этим лицам следует хорошо помыться с мылом или использовать дезинфицирующее средство. При появлении признаков инфекции проконсультируйтесь с врачом.
- Не прикасайтесь и не расчесывайте обработанный участок кожи. Вы можете перенести этот препарат на другие части тела.
- Возможно неблагоприятное воздействие данного препарата на плод. Если вы можете забеременеть, в период лечения необходимо применять противозачаточное средство. Если вы забеременеете, немедленно обратитесь к лечащему врачу.
- Сообщите врачу, если вы кормите грудью. Необходимо проконсультироваться, не представляет ли препарат какого-либо риска для ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом

или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, опухлость в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
- Одышка.
- Боль в груди.
- Белые пятна на коже.
- В месте применения препарата наблюдалось раздражение. В редких случаях возникало повреждение тканей. Сообщите медсестре, если у вас возникнет чувство жжения, изменение цвета кожи, боль, повреждение кожи или отек в месте применения препарата.
- Применение данного препарата сопровождалось герпетическими инфекциями, такими как герпес и глазные инфекции. Некоторые герпетические инфекции протекали тяжело. В том числе регистрировался смертельные исходы инфекций у пациентов со слабой иммунной системой. Обратитесь к врачу, если у вас или вашего близкого человека появились признаки герпетической инфекции, такие как слабость в руках или ногах, нечеткость зрения, боль в глазах или выделения из глаз, спутанность сознания, чувство сонливости или светочувствительность. Обратитесь к врачу, если у вас или вашего близкого человека присутствует боль, жжение, почесывание или волдыри вокруг рта, гениталий или другой части тела.

Каковы некоторые другие побочные эффекты

данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Чувство головокружения, усталости или слабости.
- Повышенная температура или озноб.
- Симптомы, напоминающие грипп.
- Головная боль.
- Запор, диарея, боль в животе, тошнота или рвота.
- Боль в руках или ногах.
- Боль в суставах или мышцах.
- Боль или раздражение в ротовой полости или глотке.
- Потеря веса.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте

всем инструкциям.

- Для инъекционного введения в опухоль. Ваш врач может ввести этот препарат не во все опухоли. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.
- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее

каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются

от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2023-02-28

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2025. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Talimogene Laherparepvec - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center