



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol

Этот документ, предоставленный Lexicomp<sup>®</sup>, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

**Торговые наименования: Канада**  
Sativex

## Предупреждение

- Этот лекарственный препарат несет высокий риск злоупотребления и привыкания. Используйте этот лекарственный препарат только в соответствии с указаниями врача. Расскажите врачу, если вы когда-либо злоупотребляли какими-либо препаратами или алкоголем либо страдали зависимостью от них.
- Пока вы принимаете это препарат, избегайте

вождения транспортных средств, а также прочих занятий и видов работ, требующих повышенного внимания.

- Данный лекарственный препарат может вызывать тахикардию или изменения кровяного давления, такие как пониженное кровяное давление. Если у Вас заболевание сердца, нарушение сердечного ритма, повышенное кровяное давление или сердечная недостаточность (ослабленное сердце), перед применением данного лекарственного препарата проконсультируйтесь с врачом. Данный лекарственный препарат может Вам не подойти.
- Если у вас бывают или когда-либо были судороги, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
- Проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем употреблять алкоголь или принимать любые препараты (рецептурные или безрецептурные), которые могут оказывать затормаживающее действие.

## **Для чего используется этот лекарственный препарат?**

- Применяется для лечения боли или ригидности мышц при множественном склерозе.

- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

## **Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?**

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у Вас или члена Вашей семьи когда-либо была шизофрения или любые другие психические расстройства или перемены настроения.
- Если у Вас заболевание печени.
- Если вы способны зачать ребенка и не применяете противозачаточные средства.
- Если Вы способны забеременеть и не используете противозачаточное средство.
- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный препарат во время беременности.
- Если вы кормите ребенка грудью. Не кормите грудью во время приема данного препарата.
- Если пациент ребенок. Не давайте данный препарат

ребенку.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

**Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Не применяйте более прописанного количества. Не применяйте чаще или дольше, чем рекомендовано врачом. Выполнение любых из этих действий может повысить риск развития очень серьезных побочных

эффектов.

- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.
- Выполняйте анализы крови и другие лабораторные анализы в соответствии с указаниями врача.
- Будьте осторожны во избежание падений или аварий и получения травм.
- Не употребляйте грейпфруты или грейпфрутовый сок.
- Не курите и не используйте другие формы конопли (марихуаны) во время приема данного лекарственного препарата. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный лекарственный препарат содержит спирт. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный препарат способен к возгоранию. Не используйте вблизи открытого огня или во время курения.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.

- При применении во время беременности возможно вредное влияние препарата на плод.
- Если вы можете забеременеть, применяйте противозачаточные средства в период приема данного препарата и в течение 3 месяцев после получения последней дозы. Эффективность противозачаточных таблеток и других гормональных противозачаточных средств может быть недостаточной для предотвращения беременности. Если вы применяете гормональные противозачаточные средства, используйте в течение этого времени и другие виды противозачаточных средств, например презервативы. Если вы забеременеете, немедленно обратитесь к лечащему врачу.
- Если ваша половая партнерша может забеременеть, применяйте противозачаточные средства в период приема данного препарата и в течение 3 месяцев после получения последней дозы этого препарата. Если ваша партнерша забеременеет, немедленно обратитесь к врачу.

**О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь

серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Учащенное или замедленное сердцебиение.
- Судороги.
- Непроходимость мочевыводящих путей.
- Рассеянность внимания.
- Изменение баланса.
- Невнятная речь.

- Затуманенное зрение.
- Изменения аппетита.
- Затрудненная речь.
- Тревожность.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Этот препарат может вызывать головокружение, проблемы с памятью, изменения настроения или поведения, сильные трудноконтролируемые побуждения, спутанность сознания, а также нарушение контакта с реальностью. Кроме того, при применении данного лекарственного препарата у людей случались обмороки. Некоторые такие явления могут проходить после уменьшения дозировки или изменения лечащим врачом частоты приема данного препарата. При возникновении любого из перечисленных эффектов, изменений настроения или мыслей о самоубийстве немедленно обратитесь к врачу.

### **Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь

с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Раздражение в месте применения препарата.
- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Запор, диарея, боль в животе, тошнота или рвота.
- Сухость во рту.
- Изменение способности к восприятию вкуса.
- Изменение цвета слизистой полости рта и зубов.
- Кашель.
- Першение в горле.
- Вялость, чувство опьянения или недомогание.
- При ощущении «кайфа» (смех и хорошее настроение без особой на то причины).

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

## Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Осторожно взболтайте перед применением.
- Перед первым использованием нажмите на пульверизатор 2–3 раза до появления взвеси.
- Впрысните в рот под язык или на внутренние стороны щек.
- Делайте перерыв между каждым впрыскиванием длительностью не менее 15 минут.
- После завершения приема дозы закройте колпачком.
- Наносите спрей в разные места во рту.
- Не распыляйте в нос.
- Не вдыхайте спрей.
- Не опрыскивайте заднюю стенку горла.
- Не распылять на изъязвленные или воспаленные

участки полости рта.

- Держите ингалятор подальше от глаз. При попадании данного лекарственного препарата в глаза немедленно промойте глаза водой. Если раздражение или покраснение глаз сохраняется, проконсультируйтесь с врачом.

### **Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?**

- Данный лекарственный препарат применяется по мере необходимости. Не применяйте препарат чаще, чем назначено врачом.

### **Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**

- Хранить неоткрытые ампулы в холодильнике. Не замораживайте.
- Храните в вертикальном положении с закрытым колпачком.
- После вскрытия упаковки хранить при комнатной температуре.
- Выбросьте все неиспользованные порции препарата через 6 недель после вскрытия упаковки.
- Защищайтесь от воздействия тепла и солнечных лучей.

- Храните этот препарат в защищенном месте, невидимом и недоступном для детей, и вне доступа других людей. В качестве защищенного места хранения препарата может выступать ящик или помещение, которые закрываются на ключ. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата,

проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю

информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

**Дата последнего пересмотра**  
2025-02-18

## Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center