



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Warfarin

Этот документ, предоставленный Lexicomp<sup>®</sup>, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

## Торговые наименования: США

Jantoven

## Торговые наименования: Канада

APO-Warfarin; TARO-Warfarin

### Предупреждение

- Данный препарат может вызвать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные кровотечения. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- При возникновении любого из этих симптомов кровотечений немедленно свяжитесь с врачом: образование синяков, черный, дегтеобразный или кровянистый стул, кровоточивость десен, кровь в моче, кашель с кровью, порезы, при которых долго не останавливается кровотечение, головокружение, ощущение очень сильной усталости или слабости, носовые кровотечения, боль или отечность, рвота кровью или рвотными массами в виде кофейной гущи или очень сильная головная боль.
- Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас появилось необычное вагинальное кровотечение или чрезмерно обильная менструация

(менструальное кровотечение).

- Во время применения данного препарата понадобится контролировать результаты анализов крови (уровень протромбинового времени/международного нормализованного отношения (PT/INR)). Это важно, чтобы убедиться в надлежащей эффективности лекарственного препарата, а также чтобы проверить наличие у Вас риска возникновения кровотечений. Проверяйте уровень протромбинового времени/международного нормализованного отношения (PT/INR) в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника. Если Вы не уверены в необходимости проверки уровня протромбинового времени/международного нормализованного отношения (PT/INR), проконсультируйтесь с врачом или другим медицинским работником.
- На уровень протромбинового времени/международного нормализованного отношения (PT/INR) может повлиять диета и некоторые препараты. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Избегайте занятий и активных видов спорта, которые могут повысить риск получения травмы или возникновения кровотечения.

## **Для чего используется этот лекарственный препарат?**

- Препарат применяется для лечения или профилактики тромбов.
- Применяется для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта и летального исхода у некоторых людей.

## **Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?**

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

- Если у вас имеются любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: проблемы с сосудистой системой, в том числе: аневризма или расслаивающаяся аневризма аорты; кровотечения; кровоизлияние в головной мозг; язвенная болезнь в стадии обострения; кровотечение желудка, кишечника, мочевых путей, гениталий или дыхательных путей; проблемы крови; инфекция сердца; пониженный уровень тромбоцитов, перикардит, недавно перенесенная операция на глазах, мозге или позвоночнике; либо очень высокое кровяное давление.
- Если у Вас имеются любые из перечисленных проблем со здоровьем: определенное заболевание под названием преэклампсия, судороги во время беременности (эклампсия), индукция родов или угроза выкидыша.
- При намерении пройти операцию необходимо проконсультироваться с врачом.
- Если Вам будут проводить спинальную анестезию или спинальное введение препарата.
- Если к Вам применяли спинальную анестезию, проводили операцию на позвоночнике или любые процедуры на позвоночнике, проконсультируйтесь с врачом.
- Если Вы знаете, что Вы не будете принимать данный лекарственный препарат или вам не будут проверять уровень протромбинового времени/международного нормализованного отношения (PT/INR) в соответствии с указаниями.
- Если у вас отмечается понижение уровня тромбоцитов, вызванное гепарином.
- При беременности.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со

здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи. Возможно, потребуется приостановить прием данного лекарственного препарата перед проведением определенных типов хирургических вмешательств в соответствии с указаниями Вашего врача. В случае приостановки лечения данным лекарственным препаратом Ваш врач сообщит Вам, когда можно будет возобновить прием данного препарата после проведения Вам хирургического вмешательства или процедуры.
- Будьте осторожны во избежание падений или аварий и получения травм.
- Если Вы упали, получили травму или ударились головой, немедленно свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом, даже если Вы нормально себя чувствуете.
- Существует повышенная вероятность кровотечений. Будьте осторожны и избегайте травм. Пользуйтесь мягкой зубной щеткой и электробритвой.
- Проконсультируйтесь с врачом, если вы часто пьете грейпфрутовый сок или едите грейпфруты.
- Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как принимать препараты, содержащие аспирин, антикоагулянты, чеснок, женьшень, гинкго, ибупрофен и подобные ему соединения, болеутоляющие или витамин Е.
- Некоторые продукты могут повлиять на уровни протромбинового

времени/международного нормализованного отношения (PT/INR).  
Придерживайтесь диеты, рекомендованной врачом или другим медицинским работником.

- Поговорите с Вашим лечащим врачом о количестве витамина К в Вашем рационе. Витамин К может влиять на эффективность данного лекарственного препарата. Вам не следует избегать употреблять все продукты питания, в которых содержится витамин К. Тем не менее, изо дня в день Вам понадобится следить за тем, чтобы количество витамина К в Вашем рационе было примерно одинаковым. Многие продукты питания содержат витамин К. К ним относятся некоторые виды зелени, брокколи, печень и некоторые растительные масла. Получите перечень продуктов питания, в которых содержится витамин К, у своего лечащего врача. Не вносите значительных изменений в Ваш обычный рацион без консультации с лечащим врачом.
- Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как принимать мультивитамины, натуральные продукты или биодобавки. В них может содержаться витамин К.
- При себе необходимо иметь карту безопасности пациента.
- При появлении у Вас диареи, высокой температуры тела или инфекции немедленно обратитесь к врачу.
- Если Вы начинаете или прекращаете курить, проконсультируйтесь с врачом. Может потребоваться изменить необходимую Вам дозу препарата.
- Применение данного лекарственного препарата сопровождалось очень тяжелым, а иногда смертельно опасным нарушением состояния здоровья, поражающим кожу (кальцифилаксия). Это отмечалось как у пациентов с очень тяжелыми нарушениями со стороны почек, так и у пациентов без таких нарушений. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если вы уроженец Азии, осторожно принимайте это лекарство. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Если Вам 60 лет или больше, принимайте этот препарат с осторожностью. У Вас может появиться больше побочных эффектов.

- Возможно неблагоприятное воздействие данного препарата на плод. Перед началом приема данного препарата вы пройдете тест на беременность, чтобы подтвердить, что вы НЕ беременны.
- Если вы можете забеременеть, применяйте противозачаточные средства в период приема данного препарата и в течение 1 месяца после получения последней дозы. Если вы забеременеете, немедленно обратитесь к лечащему врачу.
- Сообщите врачу, если вы кормите грудью. Необходимо проконсультироваться, не представляет ли препарат какого-либо риска для ребенка.

## **О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, проблемы с сохранением равновесия, обвисание одной стороны лица или нечеткость зрения.
- Боль в груди.
- Сильное головокружение или обморок.
- Воспаление, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в ноге или руке.

- Сильная головная боль.
- Чувство крайней усталости или слабости.
- Воспаление.
- Изменение цвета кожи на черный или фиолетовый.
- В редких случаях возможно омертвление кожной ткани. Это может привести к потере части тела (ампутации) и может привести к смерти. В случае возникновения боли, изменения цвета или температуры в любой части тела немедленно обратитесь к врачу.
- Если у Вас нарушение функции почек или Вы перенесли его ранее, проконсультируйтесь с врачом. Возможны повреждения почек. Немедленно свяжитесь с врачом в случае возникновения у Вас признаков проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.

## **Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом или обратитесь за медицинской помощью, если Вас беспокоят любые побочные эффекты, или если побочные эффекты имеют стойкий характер.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1- 800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

## Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Применяйте этот препарат в строгом соответствии с указаниями врача, даже если Вы чувствуете себя хорошо. Это важно для надлежащей эффективности лекарственного препарата и снижения риска возникновения кровотечения.
- Принимайте данный препарат приблизительно в одно и то же время дня.
- Беременным нельзя обращаться с измельченными или разломанными таблетками. Если беременная прикоснется к раздавленной или измельченной таблетке, ей следует немедленно промыть место контакта водой с мылом.

## Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу в тот же день, как только вспомните об этом.
- Если Вы до следующего дня не вспомнили о пропущенной дозе, пропустите пропущенную дозу и вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не принимайте более 1 дозы данного препарата в течение одного дня.

## Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и

домашних животных.

- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве

инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Дата последнего пересмотра**

2023-07-14

## **Авторское право**

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.  
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Warfarin - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center