

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Baclofen

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Fleqsuvy; Gablofen; Lioresal; Lyvispah; Ozobax DS; Ozobax [DSC]

Торговые наименования: Канада

АРО-Baclofen; Baclofen-10; Baclofen-20; Lioresal Intrathecal; MYLAN-Baclofen; PMS-Baclofen; RIVA-Baclofen

Предупреждение

Инфузия:

- При резком прекращении приема данного препарата возникали опасные побочные эффекты. Среди таких побочных эффектов были высокая температура тела, изменения психического состояния, учащение судорог и ригидность мышц. В редких случаях такие побочные эффекты приводили к очень тяжелым нарушениям в работе мышц, органов и становились причиной летального исхода. Не прекращайте прием этого препарата резко, не проконсультировавшись с врачом. Обязательно своевременно пополняйте помпу ребенка и ознакомьтесь с ее тревожными сигналами и порядком действий при срабатывании таких сигналов. Сообщите врачу, если у Вашего ребенка когда-либо отмечались признаки синдрома отмены на фоне применения баклофена в таблетках или инъекциях. При возникновении у ребенка признаков синдрома отмены немедленно свяжитесь с врачом.
- Подробная информация приведена на вкладыше в упаковке.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения спазмов при рассеянном склерозе или заболеваниях спинного мозга.
- Данный препарат можно давать детям и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.

Инфузия:

- При инфекции у ребенка.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратов и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Следите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения заданий или действий, которые требуют концентрации внимания, пока Вы не увидите, как этот лекарственный препарат действует на Вашего ребенка. Сюда относятся езда на велосипеде, занятия спортом или использование таких предметов, как ножницы, газонокосилка, электросамокат, игрушечные машинки или моторные средства передвижения.

- Алкоголь может взаимодействовать с данным лекарственным препаратом. Следите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
- Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, перед тем, как он будет употреблять марихуану, другие формы каннабиса, рецептурные или безрецептурные препараты, которые могут замедлить действия вашего ребенка.
- Вашему ребенку нельзя резко прекращать прием данного препарата. Так можно увеличить риск развития побочных эффектов у Вашего ребенка. К ним могут относиться галлюцинации (состояние, когда кажется, что видишь или слышишь то, чего нет), судороги, высокая температура, скованность мышц и спутанность сознания. В редких случаях это могло привести к нарушению функционирования органов и даже к смерти. В случае необходимости прием данного препарата ребенком нужно прекращать постепенно, в соответствии с предписаниями врача. Сообщите врачу, если у Вашего ребенка возникнут новые симптомы или ухудшатся имеющиеся.
- Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У детей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть более высоким.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.
- Применение этого препарата во время беременности может привести к развитию синдрома отмены у новорожденного.

Инъекция:

- Если препарат перестал помогать вашему ребенку, сообщите об этом его лечащему врачу. Не давайте препарат ребенку в более высоких дозах, чем прописал врач.

О каких побочных эффектах мне следует

немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Сильное головокружение или обморок.
- Спутанность сознания.
- Появление или усугубление психических расстройств, перепадов настроения или изменений поведения.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Судороги.
- Изменение баланса.
- Изменение зрения.
- Боль в груди.
- Мышечная боль или слабость.
- Ригидность мышц.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Затрудненное, медленное или поверхностное дыхание.

- Затруднение при мочеиспускании или изменение количества выделяемой мочи.
- Изменение частоты мочеиспусканий.
- Кровь в моче.
- Отек рук или ног.
- Неконтролируемые движения тела, судорожные движения, нарушение равновесия, трудности с глотанием или речью.
- Потеря контроля над движениями глаз.
- Ощущение ненормального сердцебиения.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Нарушения сна.
- Тошнота или рвота.
- Головная боль.
- Запор.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Таблетки:

- Давайте данный лекарственный препарат независимо от приема пищи.

Все жидкие препараты:

- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.
- Данный препарат нельзя отмерять обычной чайной или столовой ложкой. Это может привести к превышению дозы препарата.

Жидкость (суспензия):

- Хорошо взболтайте перед применением.
- Некоторые марки этого препарата можно применять в сочетании с зондами для энтерального питания. Если у вашего ребенка есть зонд для энтерального питания, необходимо четко знать, можно ли использовать марку препарата вашего ребенка. Давайте препарат в соответствии с указаниями. Промойте зонд для энтерального питания после введения этого препарата.

Гранулы для перорального приема:

- Этот препарат можно положить непосредственно в рот ребенку. Гранулы растворятся во рту или ваш ребенок может их проглотить. При необходимости этот препарат также можно смешивать с жидкостями или мягкими продуктами, такими как яблочное пюре,

йогурт или пудинг. Добавьте содержимое 1 пакета в 1 столовую ложку (15 мл) жидкой или мягкой пищи. Если доза для вашего ребенка превышает 1 пакет, дозу из каждого отдельного пакета смешивайте отдельно. Данный препарат необходимо давать в течение 2 часов после смешивания.

- Этот препарат могут применять пациенты с питательными трубками. Применяйте в соответствии с указаниями. После применения данного препарата промойте питательную трубку.

Инфузия:

- Для введения в позвоночник.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

Все пероральные препараты:

- Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
- Если Вашему ребенку пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.
- Не следует давать двойную дозу одновременно или дополнительные дозы.

Инфузия:

- Свяжитесь с врачом Вашего ребенка, чтобы выяснить ход дальнейших действий.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Таблетки:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.

- Если вы разделите таблетки, может потребоваться выбросить их через определенное время. Вы должны знать, как долго можно хранить разделенные таблетки. Если вы не уверены, позвоните фармацевту.

Жидкость (раствор):

- Препарат одних торговых марок следует хранить в холодильнике. Препарат других торговых марок подлежит хранению при комнатной температуре. Проконсультируйтесь с фармацевтом, как хранить этот препарат.
- Не замораживайте.
- Предохраняйте от света.

Жидкость (суспензия):

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Выбросьте неиспользованную порцию препарата через 2 месяца после вскрытия упаковки.

Гранулы для перорального приема:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.

Инфузия:

- Если вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у врача вашего ребенка, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.

- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской

консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2024-06-28

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Baclofen - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center