

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Clindamycin (Topical)

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Cleocin; Cleocin-T; Clindacin; Clindacin ETZ; Clindacin Pac [DSC]; Clindacin-P; Clindagel; Clindesse; Evoclin [DSC]; Xaciatro

Торговые наименования: Канада

Clinda-T [DSC]; Dalacin Vaginal; TARO-Clindamycin

Для чего используется этот лекарственный препарат?

Все средства для кожи:

- Применяется для лечения угрей.
- Данный препарат можно давать детям и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Все вагинальные препараты:

- Применяется для лечения вагинальной инфекции. Если данный лекарственный препарат был назначен по какой-либо другой причине, обратитесь к врачу за дополнительной информацией.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
- Если у Вашего ребенка когда-либо было любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: болезнь Крона, некоторые другие проблемы с желудком или кишечником (колит, энтерит) или тяжелые нарушения со стороны кишечника при приеме антибиотика (тяжелая диарея, воспаление кишечника, боль в желудке).
- Если Ваш ребенок применяет любые препараты, содержащие эритромицин.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом

относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- В случае проглатывания данного препарата он может быть вреден. При случайном проглатывании этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

Все средства для кожи:

- Не накрывайте ничем (бинтами, повязками) пораженный участок, если иное не предписано врачом.
- Для достижения полного эффекта может потребоваться несколько недель.
- Перед нанесением на кожу ребенка других препаратов или продуктов проконсультируйтесь с лечащим врачом вашего ребенка. Это касается и мыла.
- Некоторые из этих препаратов способны к возгоранию. Не применяйте вблизи открытого огня или во время курения.
- Если Ваша дочь — кормящая мать, которая применяет данный препарат в области груди или соска, ей следует мыть данную область перед кормлением ребенка.

Все вагинальные препараты:

- Во время использования данного препарата не позволяйте дочери проводить спринцевание или использовать другие продукты для вагинального применения, например тампоны. Вашей дочери может потребоваться соблюдать эти ограничения некоторое время после применения последней дозы препарата. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с ее лечащим врачом.
- Не давайте ребенку дольше, чем было назначено. Возможно возникновение вторичной инфекции.

Если Ваш ребенок ведет или может вести половую жизнь:

- Во время применения данного препарата вашему ребенку нельзя вступать в половые отношения. Воздержание от половых контактов может потребоваться некоторое время после применения последней дозы препарата. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка.

Вагинальный гель:

- Во время применения данного лекарственного препарата и в течение 7 дней после прекращения его применения полиуретановые презервативы могут

утратить свой противозачаточный эффект или свою способность к защите от заражения заболеваниями, передающимися половым путем. В течение этого времени вашему ребенку нужно будет использовать латексные или полиизопреновые презервативы.

Все другие вагинальные препараты :

- Во время применения данного лекарственного препарата вашим ребенком и в период после прекращения его применения презервативы или диафрагмы могут на время утратить свой противозачаточный эффект или свою способность к защите от заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Ребенку потребуется применять какое-либо другое противозачаточное средство некоторое время после применения последней дозы препарата. Убедитесь в том, что вы точно знаете, как долго нужно будет это делать.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом

Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- При применении большинства антибактериальных препаратов регистрировались случаи тяжелой формы диареи — диареи, вызываемой бактериями *Clostridium difficile* (C. diff.) [CDAD]. В некоторых случаях это заболевание может приводить к смерти. Это может произойти как во время приема антибиотика, так и в течение нескольких месяцев после того, как ребенок прекратил его прием. При появлении у ребенка болей или спазмов в животе или жидкого, водянистого или кровавистого кала немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечить диарею самостоятельно без

предварительной консультации с лечащим врачом.

Все вагинальные препараты:

- Признаки инфекции мочевыводящих путей, в т. ч. кровь в моче, чувство жжения или болевые ощущения при мочеиспускании, частые или urgentные позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части живота или в области таза.
- Вагинальный зуд или выделения.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

Все средства для кожи:

- Раздражение в месте применения препарата.
- Ожог.
- Зуд.
- Сухая кожа.

- Краснота.
- Жирная кожа.

Пена:

- Головная боль.

Все вагинальные препараты:

- Раздражение в месте применения препарата.
- Боли в спине.
- Запор.
- Головная боль.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все средства для кожи:

- Не для приема внутрь. Только для детской кожи. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза Вашего ребенка (возможен ожог).
- Продолжайте использовать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или другого медицинского работника, даже если состояние Вашего ребенка улучшилось.
- Мойте руки до и после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.
- Не наносите на открытые раны или поврежденную кожу.

Лосьон:

- Хорошо взболтайте лосьон перед применением.

Тампоны:

- Если применяются компрессы (тампоны), следует вынимать тампон из фольги непосредственно перед применением. Используйте 1 раз и выбросите. Можно использовать более одного компресса.

Пена:

- Нанесите пену на холодную поверхность или в колпачок. Не допускайте контакта пены с руками.
- Если емкость кажется теплой или пена кажется слишком жидкой, опустите емкость в проточную холодную воду.

Все вагинальные препараты:

- Препарат не предназначен для приема внутрь. Только для вагинального применения. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза Вашего ребенка (возможен ожог).
- Продолжайте использовать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или другого медицинского работника, даже если состояние Вашего ребенка улучшилось.
- Мойте руки до и после применения.

Вагинальный крем:

- Некоторые продукты должны использоваться перед сном. Для некоторых продуктов время приема не имеет значения. Узнайте у фармацевта, как применять этот лекарственный препарат.

Вагинальный гель:

- Не используйте аппликаторы повторно.

Суппозитории:

- Принимайте перед сном.
- Перед использованием свечи снимите обертку из фольги.
- Не используйте, если упаковка лекарственного препарата разорвана, открыта или не запечатана надлежащим образом.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

Вагинальный гель:

- Необходимо принять только 1 дозу этого лекарственного препарата. Если Ваш ребенок пропустил прием очередной дозы, дайте ее, как только вспомните.

Все прочие лекарственные формы:

- Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
- Если Вашему ребенку пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.
- Не следует давать двойную дозу одновременно или

дополнительные дозы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Берегите от жары.
- Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Пена:

- Не подвергайте воздействию тепла и солнечного света. Не прокалывайте и не сжигайте, даже если он кажется пустым.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим

источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical->

effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра

2025-04-14

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Clindamycin (Topical - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center