

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Lidocaine (Topical

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

7T Lido [DSC]; Abreva Rapid Pain Relief [OTC]; Alocane Emergency Burn Max Str [OTC]; Alocane First Aid Spray [OTC]; Alocane Max Emer Burn w/ Anti [OTC]; Alocane Max [OTC]; Alocane Plus [OTC]; AneCream [OTC]; AneCream5 [OTC]; Asperflex Lidocaine [OTC]; Asperflex Max St [OTC]; Asperflex Pain Relieving [OTC]; Astero; Bactine Max Dry Spray [OTC]; Bactine Max Spray [OTC]; Bactine Max [OTC]; Blue Tube/ Aloe [OTC] [DSC]; Bruselix; Burn Gel [OTC]; DermacinRx Lidogel; Eha; First Care Pain Relief [OTC]; FT Pain Relief Max Strength [OTC]; Gen7T [DSC]; Glydo; GoodSense Burn Relief [OTC]; HealthWise Pain Relief [OTC]; Jelcaine

Sterile [OTC]; LDO Plus; LevigoSP [OTC]; Lido King [OTC]; Lido-Sorb; Lidocaine Max St 24 Hours [OTC]; Lidocaine Pain Relief Max St [OTC]; Lidocaine Pain Relief [OTC]; Lidocaine Plus [OTC]; Lidocan; Lidocanna [OTC]; Lidocore [OTC]; Lidoderm; LidoDose Pediatric Bulk Pack [OTC]; LidoDose [OTC]; LidoFore Flexipatch [OTC] [DSC]; Lidogel [OTC] [DSC]; LidoHeal-90 [OTC] [DSC]; LidoLite [DSC]; Lidopac [DSC]; Lidopin; LidoPure Patch; Lidorex; LidoRx; Lidosol [DSC]; Lidosol-50 [DSC]; Lidotral; Lidotral 1; Lidotral Roll-On; Lidotran; Lidotrex (Aloe Vera) [DSC]; Lidotrode [OTC]; Lidovix L; Lipocaine 5 [OTC]; LMX 4 Plus [OTC]; LMX 4 [OTC]; LMX 5 [OTC]; Lubricaine [OTC]; Lydexa; Medi-First Burn Spray [OTC]; Moxicaine [DSC]; NeuroMed7 [OTC] [DSC]; Neurozyl; NumbCream [OTC]; Pain Relief Maximum Strength [OTC]; Pain Relieving [OTC] [DSC]; Pharmacist Choice Lidocaine [OTC]; Pharmacist Choice Pain Relief [OTC] [DSC]; Predator [OTC] [DSC]; Premium Lidocaine; Proxivol; RadiaGuard Advanced [OTC]; Re-Lieved Maximum Strength [OTC]; RectaSmoothe [OTC]; RectiCare [OTC]; RectoProtect [OTC]; Salonpas Pain Relieving [OTC]; Sun Burnt Plus [OTC]; TheraCare Lidocaine Max Str [OTC]; TheraCare Pain Relief [OTC]; Theraworx Diabet Pain Roll-On [OTC]; Theraworx PM Pain Relf Roll-On [OTC]; Topicaine 5 [OTC]; Topicaine [OTC]; Tridacaine; Tridacaine II; Tridacaine III;

Trilocaine; Trilogel [OTC]; True Lido [OTC]; Ultra Lido [OTC]; Venipuncture Px1 Phlebotomy; XeroBurn [OTC]; Xolido XP [OTC] [DSC]; Xolido [OTC] [DSC]; Xyliderm; ZiloVal [DSC]; Zingo [DSC]; Zionodil; Zionodil 100; ZTlido; Zylotrol-L [OTC] [DSC]

Торговые наименования: Канада

Cathejell; Jelido; Lidodan; Lidodan Endotracheal; Xylocaine; Xylocaine Spray

Предупреждение

Вязкий лидокаин

- У детей младше 3 лет отмечались очень тяжелые нарушения (такие как судороги и остановка сердца) и случаи смерти. В этих случаях данный препарат применялся не так, как было рекомендовано. Не применяйте данный препарат для лечения младенцев и детей с болью при прорезывании зубов. Проконсультируйтесь с врачом.
- У детей младше 3 лет данный препарат следует применять только в тех случаях, когда применение других препаратов невозможно. В случае применения у ребенка младше 3 лет по другим показаниям, помимо боли при прорезывании зубов, следуйте инструкциям врача. Проконсультируйтесь с врачом.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для купирования боли.
- Применяется для лечения болезненных нервных заболеваний.

- Применяется для лечения симптомов геморроя и раздражения прямой кишки.
- Этот препарат применяют для лечения ран в полости рта.
- Данный препарат можно давать детям и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Трансдермальная терапевтическая система (ZTlido) и свечи:

- Если Ваш ребенок принимал эту форму данного лекарственного препарата, узнайте у врача о преимуществах и рисках. Проконсультируйтесь с врачом при возникновении вопросов или опасений по поводу применения данного препарата Вашим ребенком.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.

Ректальный крем, ректальный гель и все

препараты для нанесения на кожу:

- Если в месте применения препарата инфекция.
- Если у Вашего ребенка имеются повреждения или открытые раны на коже в местах, на которых должен применяться препарат.
- Если кожа ребенка в области применения препарата воспалена, онемела или не воспринимает болевые ощущения.

Все средства для кожи:

- В случае необходимости применения на большом участке поверхности кожи.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он

уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- При применении лекарственных препаратов, подобных этому, возникало тяжелое нарушение со стороны крови под названием «метгемоглобинемия». Риск этого нарушения может быть повышен у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г6ФД) и с заболеваниями сердца или легких. Риск также может возрастать при применении некоторых других лекарственных препаратов, а также у младенцев в возрасте до 6 месяцев. Если у вашего ребенка когда-либо обнаруживалась метгемоглобинемия, сообщите об этом врачу.

- Различные торговые марки этого препарата могут быть предназначены для использования у детей разных возрастов. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
- Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У детей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть более высоким.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

Ректальный крем, ректальный гель и все препараты для нанесения на кожу:

- Перед нанесением на кожу ребенка других препаратов или продуктов проконсультируйтесь с лечащим врачом вашего ребенка. Это касается и мыла.
- Не давайте данный лекарственный препарат Вашему ребенку дольше предписанного врачом периода времени.
- Не давайте ребенку расчесывать или растирать

онемевшую кожу. Не допускайте сильного нагревания или охлаждения кожи.

- Не наносите на порезы, царапины или поврежденные участки кожи, только если врач не рекомендовал иное.
- Ваш ребенок должен избегать использования источников тепла (таких как ультрафиолетовые лампы, солярии, подушки с подогревом, электрические одеяла, нагревательные лампы, сауны, горячие ванны, водяные матрасы с подогревом). Он должен избегать длительного приема горячих ванн и не загорать. Температура тела вашего ребенка может повыситься, и его организм получит слишком большое количество препарата.

Ректальный крем, ректальный гель и препараты для нанесения на кожу, кроме накожного пластыря и трансдермальной терапевтической системы:

- В случае проглатывания данного препарата он может быть вреден. При случайном проглатывании этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Кожный пластырь:

- Следите, чтобы пластырь Вашего ребенка не намокал. Пластырь может не приклеиться. Следите, чтобы Ваш ребенок не купался, не плавал и не принимал душ, пока он носит пластырь.
- Если у Вашего ребенка появилось жжение или другое раздражение в месте наложения этого препарата, снимите его. Подождите, пока не исчезнет раздражение, и наденьте его снова.
- Во время и после лечения часто регистрируются реакции со стороны кожи в месте прикрепления пластыря. Эти реакции включают волдыри, кровоподтеки, чувство жжения или неприятные ощущения, изменение цвета, отек, покраснение, боль, зуд, шелушение или отслоение кожи, а также угревую сыпь. В большинстве случаев указанные реакции со стороны кожи исчезают в течение нескольких минут или часов. Свяжитесь с врачом, если какой-либо из этих эффектов имеет тяжелое течение, беспокоит ребенка или не проходит.
- Ваш ребенок может носить одежду поверх того места, куда нанесен этот препарат.
- Разжевывание или проглатывание этого препарата может причинить вред. Это также относится к использованным пластырям. В случае приема этого лекарственного препарата внутрь немедленно

вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Все пероральные препараты:

- Не позволяйте вашему ребенку принимать пищу при наличии чувства онемения во рту. Может произойти прикусывание языка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее

дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Симптомы повышения кислотности крови (ацидоза), такие как спутанность сознания, учащенное дыхание, тахикардия, нарушение сердцебиения, очень сильная боль в животе, тошнота или рвота, выраженная сонливость, одышка, повышенная утомляемость или слабость.
- Признаки метгемоглобинемии, такие как синюшный или серый оттенок губ, ногтей или кожи; ощущение ненормального сердцебиения; судороги; тяжелое головокружение или потеря сознания; тяжелая головная боль; сильная сонливость; чувство усталости или слабости; одышка. Такое действие возникает редко, но в случае развития может привести к смертельному исходу.
- Затрудненное, медленное или поверхностное дыхание.
- Сильное онемение и покалывание.
- Головокружение, сонливость, спутанность сознания или нечеткость зрения.

- Судороги.
- Изменение зрения.
- Нервное напряжение и возбужденность.
- Головокружение или обморок.
- Звон в ушах.
- Тошнота или рвота.
- Чувство жара или холода.
- Тремор.
- Подергивание.
- Брадикардия.
- Боль в груди.

Все средства для кожи:

- Признаки кожной инфекции, такие как мокнутие, повышение температуры, отек, покраснение или боль.

Все лекарственные препараты для ректального применения:

- Боль в прямой кишке или ректальная боль.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь

побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

Все формы выпуска:

- Раздражение в месте применения препарата.

Ректальный крем, ректальный гель и препараты для нанесения на кожу, кроме на кожного пластыря и трансдермальной терапевтической системы:

- Воспаление.
- Краснота.
- Изменение цвета кожи.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Ректальный крем и гель:

- Мойте руки до и после применения препарата.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Наносите данный препарат в соответствии с инструкциями врача или указаниями на этикетке.

Все средства для кожи:

- Не для приема внутрь. Только для детской кожи. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза Вашего ребенка (возможен ожог).
- При попадании данного препарата на любой другой из этих участков кожи Вашего ребенка, промойте хорошо водой.
- Мойте руки до и после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Наносите на чистую, сухую, здоровую кожу.

- Не накладывайте какие-либо покрытия (бинты, повязки), если иное не предписано врачом.

Спрей и жидкость для кожи:

- Данный препарат способен к возгоранию. Не используйте вблизи открытого огня или во время курения.
- Некоторые из данных лекарственных препаратов необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.

Спрей:

- При нанесении спрея на лицо ребенка попрыскайте жидкость на ладонь или марлю и приложите ее к лицу.

Кожный пластырь:

- Наносите на наиболее болезненные участки кожи.
- Чтобы покрыть пораженный участок, необходимо обрезать пластырь.
- Наносите пластырь приблизительно в одно и то же время дня.
- Различные продукты могут оставаться

нанесенными на кожу в течение разных периодов времени. Убедитесь, что вы знаете, как долго этот лекарственный препарат должен оставаться нанесенным до снятия. Убедитесь, что вы знаете, какой должен быть перерыв перед наклеиванием нового пластыря или накожной системы. Не наносите препарат на больший срок, чем было назначено. При возникновении вопросов побеседуйте с врачом.

- Не наносите больше кожных пластырей, чем вам назначил врач.
- Если пластырь отклеивается по краям, плотно прижмите края. Если он оторвется, попробуйте надеть его снова. Если вы не можете снова укрепить прежний пластырь, наденьте новый.
- После снятия пластыря согните его пополам, соединив между собой клейкие стороны. Выбрасывайте использованные пластыри туда, где они будут недоступны для детей и домашних животных.
- Некоторые из этих препаратов способны к возгоранию. Не применяйте вблизи открытого огня или во время курения.

Все пероральные препараты:

- В случае применения в виде жидкости для полоскания, проследите за тем, чтобы Ваш ребенок полоскал ротовую полость как можно дольше. Проследите за тем, чтобы ребенок проглотил или сплюнул жидкость, в соответствии с инструкциями врача.
- При использовании ватного тампона наносите препарат на поврежденный участок в соответствии с рекомендациями врача или указаниями в инструкции по применению препарата.
- Не давайте ребенку ничего есть в течение как минимум 60 минут (1 часа) после применения данного лекарственного препарата.

Жидкость для полости рта:

- Хорошо взболтайте перед применением.
- Аккуратно отмеряйте дозы жидкости.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

- Если Ваш ребенок принимает препарат регулярно, дайте пропущенную дозу, как только вспомните о ней.
- Если Вашему ребенку пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную

дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.

- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозы.
- В большинстве случаев данный препарат применяется по мере необходимости. Не давайте ребенку препарат чаще, чем прописал врач.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Спрей и жидкость для кожи:

- Предохраняйте от воздействия тепла или открытого пламени.

Спрей:

- Не протыкать.

Кожный пластырь:

- Хранить в недоступном для детей месте, в мешке, поставляемом вместе с данным лекарственным препаратом.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье,

медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов.

Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2024-02-16

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Lidocaine (Topical - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center