

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Trametinib

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Mekinist

Торговые наименования: Канада

Mekinist

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения рака.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.

Если Ваша дочь кормит ребенка грудью:

- Следите за тем, чтобы Ваша дочь не кормила ребенка грудью во

время приема этого лекарственного препарата и в течение 4 месяцев после приема последней дозы.

Таблетки:

- Если ваш ребенок не может глотать таблетки.

Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и заболеваниями может быть неблагоприятно.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Иногда дабрафениб применяют вместе с траметинибом. Если ваш ребенок принимает одновременно дабрафениб и траметиниб, убедитесь в том, что вы осведомлены о побочных эффектах каждого из препаратов. При одновременном применении этих препаратов риск возникновения определенных побочных эффектов может возрастать. Эти побочные эффекты могут быть тяжелыми и могут приводить к смерти. Они включают кровотечение, кровоизлияние в головной мозг, тромбы, нарушения со стороны глаз, высокую

температуру, нарушения со стороны сердца (такие как сердечная недостаточность), повышенный уровень сахара в крови, прочие злокачественные новообразования и тяжелые реакции со стороны кожи, например синдром Стивенса — Джонсона. Обсудите с врачом риск развития у ребенка побочных эффектов, вызываемых принимаемыми препаратами.

- Применение данного лекарственного препарата сопровождалось повышенным кровяным давлением. Контролируйте кровяное давление Вашего ребенка в соответствии с указаниями врача.
- Проводите анализ крови и обследование глаз ребенка в соответствии с указаниями его врача.
- Осматривайте кожу ребенка. Сообщите врачу при появлении у Вашего ребенка любых изменений кожи, таких как новая бородавка, кожная язва или красноватая кровоточащая или не заживающая припухлость, либо изменение цвета или размера родинки.
- Во время применения данного лекарственного препарата регистрировались случаи, связанные с образованием тромбов. Тромбообразование может быть опасным для жизни. Если ваш ребенок ранее сталкивался с тромбообразованием, сообщите об этом врачу. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный препарат может вызывать нарушения детородной функции. Это может негативно повлиять на способность иметь детей. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если ваш ребенок находится в детородном возрасте, перед началом приема препарата необходимо провести тест на беременность, чтобы убедиться в отсутствии беременности.

Если Ваш ребенок ведет или может вести половую жизнь:

- В период лечения и в течение некоторого времени после получения последней дозы этого препарата вашей дочери необходимо применять противозачаточное средство. Узнайте у ее лечащего врача, как долго следует применять противозачаточные средства.

Если ваша дочь забеременела, немедленно обратитесь к ее лечащему врачу.

- Если половой партнер вашего ребенка забеременел или может забеременеть, в период лечения и в течение некоторого времени после получения последней дозы этого препарата вашему ребенку необходимо пользоваться презервативом. Использовать презерватив следует, даже если ваш ребенок перенес вазэктомию. Узнайте у лечащего врача, как долго ваш ребенок должен использовать презервативы. Если половой партнер вашего ребенка забеременел или забеременеет, немедленно обратитесь к врачу.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки кровотечения, такие как рвота или кашель с кровью; рвота вида кофейной гущи; кровь в моче; черный, красный или дегтеобразный стул; кровотечение из десен; нециклическое вагинальное кровотечение; кровоподтеки, возникающие или увеличивающиеся беспричинно; кровотечение, которое вы не

можете остановить. В некоторых случаях это приводило к смертельному исходу.

- Признаки легочных или дыхательных проблем, такие как одышка или затрудненное дыхание, кашель или повышение температуры тела.
- Признаки нарушения баланса жидкости и электролитов, такие как изменения настроения, спутанность сознания, мышечные боли или слабость, быстрый или нарушенный сердечный ритм, сильное головокружение или потеря сознания, сильная жажда, судорожные приступы, чувство сильной утомляемости или слабости, снижение аппетита, невозможность помочиться или изменение количества выделяемой мочи, сухость во рту, сухость глаз, сильная тошнота или рвота.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Повышенная температура или озноб.
- Покраснение или раздражение кожи ладоней или подошв ступней ног.
- Немедленно свяжитесь с врачом, если у Вашего ребенка наблюдаются признаки тромбоза, такие как боль или чувство стеснения в груди; кашель с кровью; одышка; отек, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в ноге или руке; затрудненные речь или глотание.
- Применение данного препарата сопровождалось тяжелыми состояниями глаз (включая отслоение сетчатки). Эти состояния могут привести к слепоте. Сообщите врачу или немедленно обратитесь за медицинской помощью, если ваш ребенок начинает видеть гало или яркие цвета вокруг источников света, мигающие

огни, плавающие предметы, тени, похожие на занавески перед глазами, или внезапно теряет зрение.

- Этот препарат может вызывать развитие сердечной недостаточности. Во время применения этого препарата вашему ребенку нужно будет контролировать работу сердца. При появлении у ребенка признаков нарушения функции сердца, таких как вновь возникшие или усилившееся кашель или одышка, отеки ног или лодыжек, нарушение сердечного ритма, увеличение массы тела более чем на 2,3 кг (5 фунтов) в течение 24 часов, головокружение или обморок, немедленно свяжитесь с лечащим врачом.
- Применение этого препарата сопровождалось нарушением со стороны кишечника (колитом) и перфорацией кишечника. В некоторых случаях эти нарушения приводили к смертельному исходу. При появлении у ребенка диареи, болей или спазмов в животе, высокой температуры или очень сильной тошноты, немедленно свяжитесь с врачом.
- При приеме этого препарата наблюдалось нарушение иммунной системы, называемое гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом (ГЛГ). Если у вашего ребенка высокая температура, отек лимфатических узлов, сыпь, сильная боль в животе или отек в области живота, незамедлительно обратитесь к врачу.
- При применении данного препарата возможно возникновение реакций со стороны кожи. Однако могут возникать и тяжелые реакции со стороны кожного покрова. В их числе отмечается синдром Стивенса-Джонсона (ССД). Иногда могут поражаться другие органы. Такие реакции могут приводить к смерти. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью при появлении у вашего ребенка таких симптомов со стороны кожи, как покраснение, отек, волдыри или шелушение; при покраснении или раздражении глаз; изъязвлениях в полости рта, горле, носу, в области глаз или гениталий, а также на любых других участках кожи; при высокой температуре, ознобе, болях в теле, одышке или увеличении лимфатических узлов.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Угри.
- Сухая кожа.
- Изменение состояния ногтей.
- Тошнота или рвота.
- Ощущение усталости или слабости.
- Раздражение или боли во рту.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочтите всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все формы выпуска:

- Давайте данный препарат в одно и то же время дня.
- Препарат необходимо принимать натощак. Давайте его не менее чем

за 1 час до или через 2 часа после еды.

- Если у вашего ребенка изменяется масса тела, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, потребуется изменить прием данного лекарственного препарата.
- Если ребенка вырвало после приема дозы, не давайте ее повторно. Дайте ребенку следующую дозу согласно схеме приема.
- Продолжайте давать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или другого медицинского работника, даже если у Вашего ребенка хорошее самочувствие.

Таблетки:

- Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не разделяйте.

Раствор:

- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.
- Этот препарат можно применять в сочетании с определенными зондами для энтерального питания. Этот препарат не совместим с определенными зондами для энтерального питания.
Проконсультируйтесь с врачом. Применяйте в соответствии с указаниями. Промойте зонд для энтерального питания после введения этого препарата.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

- Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
- Если до приема ребенком следующей дозы остается менее 12 часов, не давайте ему пропущенную дозу и вернитесь к обычному графику приема препарата.

- Не следует давать двойную дозу одновременно или дополнительные дозы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Таблетки:

- Храните в холодильнике. Не замораживайте.
- Храните таблетки в бутылочке, в которой они поставляются, и не перекладывайте их в таблетницу.
- Хранить в оригинальной упаковке. Не вынимайте поглотитель влаги.

Раствор:

- Хранить в оригинальном флаконе при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Этот препарат будет смешан фармацевтом. Выбросьте этот препарат через 35 дней после смешивания. Убедитесь, что вы знаете, в какой день нужно выбросить этот препарат.

Все формы выпуска:

- Предохраняйте от света.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов.

Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2024-05-07

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Trametinib - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center