



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# **Рекомендации по введению пневмококковой вакцины страдающим раком взрослым**

Эта информация разъясняет, что такое пневмококковая вакцина и когда ее необходимо вводить.

Пневмококковая вакцина помогает предотвратить инфицирование пневмококковыми бактериями. Эти бактерии могут вызывать пневмонию (инфекцию легких), менингит (воспаление оболочек вокруг головного мозга) и другие тяжелые заболевания, способные привести к смерти.

Существует 2 типа пневмококковой вакцины: Pnevna<sup>®</sup> 13<sup>®</sup> и Pnevnova<sup>®</sup> 23. Оба типа вакцины защищают от бактерий нескольких штаммов. Они вводятся в виде инъекции (укола) в мышцу.

## **График вакцинации**

Если вам никогда не вводили пневмококковую

вакцину и вы старше 18 лет, рекомендуем вам поставить:

- Pnevnaг 13 во время следующего приема у медицинского сотрудника;
- Pневмовах 23 не раньше чем через 8 недель после Pnevnaг 13.

Если вам уже вводили Pневмовах 23, подождите 1 год, прежде чем вводить Pnevnaг 13.

Поговорите со своим медицинским сотрудником, если у вас возникли какие-либо вопросы о пневмококковых вакцинах.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Pneumococcal Vaccination Guidelines for Adults with Cancer -  
Last updated on September 28, 2021

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center