

Прекратите принимать эти лекарства перед проведением аллергической пробы

Перед проведением аллергической пробы в центре MSK важно прекратить прием некоторых лекарств. Они могут повлиять на результаты вашей пробы. К таким лекарствам относятся пероральные антигистаминные препараты, антигистаминные назальные спреи, H₂-блокаторы и бета-блокаторы.

В списке ниже представлены наиболее распространенные препараты, но кроме них существуют и другие. Позвоните в кабинет аллергологии и иммунологии по телефону 646-888-3814, если:

- вы не уверены, является ли ваше лекарство антигистамином, антигистаминным назальным спреем, H₂-блокатором или бета-блокатором;
- у вас есть опасения по поводу прекращения приема лекарств;
- у вас есть еще какие-либо вопросы.

Если прекращение приема лекарства вызовет у вас очень тяжелые симптомы, сообщите об этом своему врачу. Он может найти другой способ выполнить аллергическую пробу, если вы не можете прекратить прием лекарств.

За 5 дней до аллергической пробы: Прекратите принимать пероральные антигистаминные препараты (лекарства, которые вы глотаете)

Обычными пероральными антигистаминными препаратами, отпускаемыми по рецепту и без рецепта, являются:

- Cetirizine (Zyrtec®)
- Chlorpheniramine maleate (Chlor-Trimeton®)
- Desloratadine (Clarinex®)
- Diphenhydramine (Benadryl®)
- Fexofenadine (Allegra®)
- Hydroxyzine (Atarax®, Vistaril®)
- Levocetirizine (Xyzal®)
- Loratadine (Alavert®, Claritin®)
- Снотворное (Advil® PM, Tylenol® PM, Unisom®, Vicks® NyQuil™)

За 3 дня до проведения аллергической пробы: Прекратите использовать антигистаминные назальные (носовые) спреи

Обычными антигистаминными назальными спреями, отпускаемыми по рецепту и без рецепта, являются:

- Azelastine HCL (Astelin®, Astepro®)
- Azelastine HCL и fluticasone propionate (Dymista®)
- Olopatadine HCL (Patanase®)

За 2 дня до аллергической пробы: Прекратите прием H₂-блокаторов (лекарств для борьбы с изжогой)

Обычными безрецептурными H₂-блокаторами являются:

- Cimetidine (Tagamet®)
- Famotidine (Pepcid®)
- Ranitidine (Zantac®)

За 1 день до аллергической пробы: Прекратите принимать бета-блокаторы (лекарства для снижения артериального давления)

Обычными бета-блокаторами, отпускаемыми по рецепту, являются:

- Atenolol
- Bisoprolol
- Carvedilol
- Labetalol
- Metoprolol
- Propranolol

