



مریض اور نگران کے لیے تعلیم

آپ کی اپر اینڈوسکوپي کے بارے میں

یہ معلومات آپ کو بالائی اینڈوسکوپي کے لیے تیار ہونے میں مدد دیں گی۔ اپر اینڈوسکوپي آپ کی غذائی نالی (کھانے کی نالی)، معدے، اور آپ کی چھوٹی آنت کے پے حصے کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔

آپ کی اپر اینڈوسکوپي کے دوران، آپ کا ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ ایک لچکدار ٹیوب استعمال کرے گا جسے اینڈوسکوپ کہتے ہیں۔ اس سے وہ ایک ویڈیو اسکرین پر آپ کی غذائی نالی، معدے، اور چھوٹی آنت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ٹشو کا چھوٹا نمونہ بھی لے سکتے ہیں یا ایک ابھری ہوئی رسولی (ٹشو کی افزائش) کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس طبی عمل کو بایوپسی کہتے ہیں۔

آپ کے طبی عمل سے 1 گھنٹہ پہلے

اپنی دوائیوں کے بارے میں پوچھیں

آپ کو اپنے طبی عمل سے پہلے اپنی کچھ ادویات کو لینا روکنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کریں کہ کون سی دوائیوں کا استعمال بند کرنا آپ کے لیے محفوظ ہے۔ ذیل میں چند عمومی مثالیں دی ہیں۔

Anticoagulants (خون پتلا کرنے والی)

اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا (جو آپ کے خون کے جمنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے) لیتے ہیں تو آپ کا طبی عمل انجام دینے والے ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو دوا روکنے کی تجویز

دے سکتے ہیں اس کا انحصار آپ کے کیے جانے والے طبی عمل کی نوعیت اور آپ کی جانب سے خون پتلا کرنے والی دوا لینے کی وجہ پر ہوگا۔

Examples of common blood thinners are listed below. There are others, so be sure your care team knows all the medicine you take. Do not stop taking your blood thinner without talking with a member of your care team.

- (®Meloxicam (Mobic
- Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), such as ibuprofen (Advil®, Motrin®) and (®naproxen (Aleve
- (®Pentoxifylline (Trental
- (®Prasugrel (Effient
- (®Rivaroxaban (Xarelto
- Sulfasalazine (Azulfidine®, (®Sulfazine
- (®Ticagrelor (Brilinta
- (®Tinzaparin (Innohep
- Warfarin (Jantoven®, (®Coumadin
- (®Apixaban (Eliquis
- Aspirin
- (®Celecoxib (Celebrex
- (®Cilostazol (Pletal
- (®Clopidogrel (Plavix
- (®Dabigatran (Pradaxa
- (®Dalteparin (Fragmin
- (®Dipyridamole (Persantine
- (®Edoxaban (Savaysa
- (®Enoxaparin (Lovenox
- (®Fondaparinux (Arixtra
- Heparin (shot under your (skin

ذیابیطس کی ادویات

ممکن ہے آپ ذیابیطس کے لیے انسولین یا کوئی اور ادویات لے رہے ہوں۔ آپ کو دوا کی تجویز دینے والے یلتھ کیئر فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو اپنی طبی عمل والے دن کی صبح کیا کرنا چاہیے اور سکتا ہے کہ آپ کو طبی عمل سے پہلے اپنی ادویات کی خوراک تبدیل کرنی پڑے۔

اپنی طبی عمل سے ایک دن پہلے یا اسی دن metformin (جیسے کہ Glucophage® یا Glumetza®) لیں یا کوئی بھی ایسی دوا لیں جس میں metformin (جیسے کہ Janumet®) شامل ہو۔

اگر آپ کو AICD ہے تو اپنی یلتھ کیئر فراہم کنندہ کو بتائیں

اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹبل کارڈیورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے تو اپنی MSK یلتھ کیئر فراہم کنندہ کو بتائیں۔ اگر آپ کو AICD ہے، تو آپ کو اپنا طبی عمل MSK کے مرکزی اسپتال، میموریل اسپتال میں کروانا ہوگا۔

اگر ضرورت ہے، تو اپنی ڈاکٹر سے ایک مراسلہ حاصل کریں

● اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹبل کارڈیورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے، تو آپ کو اپنی طبی عمل سے پہلے اپنے کارڈیولوجسٹ (دل کے ڈاکٹر) سے ایک کلیئرنس لیٹر لینا ہوگا۔ کلیئرنس لیٹر وہ مراسلہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی خطرے کے طبی عمل کروا سکتے ہیں۔

● اگر آپ کو گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران سینے میں درد، سرچکرانے، سانس لینے میں مشکل، یا بے ہوشی کا سامنا ہوا ہے، تو آپ کے ڈاکٹر کو آپ کا معائنہ کرنا ہوگا، اور اپنی طبی عمل سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک کلیئرنس لیٹر لینا ہوگا۔

آپ کے MSK ڈاکٹر کے دفتر میں آپ کا کلیئرنس لیٹر آپ کے طبی عمل سے کم

از کم 1 دن پہلے لازماً پہنچ جانا چاہیے۔

Arrange for someone to take you home

You must have a responsible care partner take you home after your procedure. A responsible care partner is someone who can help you get home safely. They should be able to contact your care team if they have any concerns. Make sure to plan this before the day of your procedure.

If you don't have a responsible care partner to take you home, call one of the agencies below. They'll send someone to go home with you. There's a charge for this service, and you'll need to provide transportation. It's OK to use a taxi or car service, but you still need a responsible care partner with you.

Agencies in New Jersey

Caring People: 877-227-4649

Agencies in New York

VNS Health: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے

ایک اینڈوسکوپس نرس آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے صبح 8 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان آپ کو کال کرے گا/گی۔ آپ کے ساتھ اس گائیڈ میں درج ہدایات کا جائزہ لے گا/گی اور آپ سے آپ کے سابقہ طبی ریکارڈ کے متعلق سوالات پوچھے گا/گی۔ نرس آپ کی ادویات کا بھی جائزہ لے گا/گی۔ آپ کو بتائے گا/گی کہ اپنے طبی عمل کے دن کی صبح کونسی ادویات لینی ہیں۔

انہیں درج کرنے کے لیے ذیل میں دی گئی جگہ استعمال کریں۔

آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے

پروسیجر کا وقت نوٹ کریں

ایک اسٹاف ممبر آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے دوپہر 12 بجے کے بعد آپ کو کال کرے گا۔ اسٹاف ممبر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اپنا طبی عمل کے لیے کس وقت پہنچ جانا چاہیے۔ اگر آپ کا طبی عمل پیر کے دن طے ہو، تو وہ آپ کو دو دن پہلے جمعے کو کال کرے گا۔ اگر آپ کو کال نہ آئے، تو اپنا ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کے دفتر میں کال کریں۔

اگر آپ کو اپنا طبی عمل منسوخ کروانا ہو، تو اس ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو کال کریں جس نے اسے آپ کے لیے طے کیا تھا۔

Instructions for eating



Stop eating at midnight (12 a.m.) the night before your surgery. This includes hard candy and gum

If your healthcare provider told you to stop eating earlier than midnight, follow their instructions. Some people need to fast (not eat) for longer before their surgery

آپ کے پروسیجر کا دن

پانی پینے کی ہدایات

آدھی رات کے درمیان (12 بجے رات) اور اپنی آمد کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے، صرف نیچے دی گئی فہرست میں موجود مشروبات پئیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھائیں یا پئیں اپنی آمد سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر دیں

● پانی

● سیب کا شفاف جوس، انگور کا شفاف جوس، یا کرین بیری کا شفاف جوس

● Gatorade یا Powerade

● سیاہ کافی یا سادے چائے چینی شامل کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی شامل نہ کریں

○ کسی بھی قسم کے دودھ یا کریمر کی کوئی سی بھی مقدار شامل نہ کریں اس میں نباتات پر مبنی دودھ اور کریمرز شامل ہیں

○ شہد مت شامل کریں

○ ذائقے دار سیرپ مت شامل کریں

اگر آپ کو ذیابیطیس ہے، تو ان مشروبات میں چینی کی مقدار پر توجہ دیں اگر آپ شوگر فری، کم شوگر کے حامل، یا بنا شوگر شامل کئے ان مشروبات کے ورژنز شامل کرتے ہیں تو آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا

سرجری سے قبل پانی کی کمی پوری رکھنا مددگار ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی پی لیں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی مت پئیں آپ کو اپنی سرجری کے دوران نسوں میں داخل کئے جانے والے سیال (IV) دئیے جائیں گے



اپنی آمد کو وقت سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر
دیں اس میں پانی شامل ہے

اہم باتیں

- صرف وہی ادویات لیں جن میں آپ کو کیلٹھ کیئر فراہم کنندہ نے آپ کو
آپ کو طبی عمل کی صبح لینے کو کہا تھا ان میں چند گھونٹ پانی کے
ساتھ لیں
- کوئی بھی لوشن، کریم، پاؤڈر، میک اپ، پرفیوم یا کلون استعمال نہ
لگائیں
- کوئی بھی جیولری، بشمول جسم پر کھدوائی ہوئی چیزیں اتار لیں
- قیمتی چیزیں (جیسے کہ کریڈٹ کارڈز اور جیولری) کو گھر پر ہی چھوڑ
جائیں
- اگر آپ کانٹیکٹ لینز استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے عینک استعمال
کریں

کیا کیا ساتھ لانا چاہیے

- ان ادویات کی ایک فہرست جو آپ گھر پر لیتے ہیں، بشمول پٹیاں اور
کریمیں
- آپ کا ریسکیو انیلر (جیسے کہ دم کے لیے البیوٹیرول)، اگر آپ کے پاس
ہو تو
- آپ کی عینک رکھنے کے لیے ایک کھوکھا
- آپ کا کیلٹھ کیئر پروکسی فارم، اگر آپ نے مکمل کیا ہو تو

کہاں جانا

آپ کی بالائی اینڈوسکوپي ان میں سے کسی ایک جگہ کوگی:

ڈیوڈ ایچ۔ کوچ سینٹر

530 ایسٹ 74 ویں اسٹریٹ

نیویارک، NY 10021

لفٹ کی مدد سے 8 ویں منزل پر جائیں

میموریل اسپتال (MSK کا مرکزی اسپتال) میں اینڈوسکوپي

سوئٹ

1275 یارک ایونیو (ایسٹ 67 ویں اور ایسٹ 68 ویں اسٹریٹس کے

درمیان)

نیویارک، NY 10065

لفٹ B لے کر دوسری منزل پر جائیں دائیں مڑیں اور شیشے کے دروازے

سے اینڈوسکوپي / سرجیکل ڈیپاسیٹل سوئٹ میں داخل ہوں

MSK Monmouth

480 ریڈ ہل روڈ

مڈل ٹاؤن، NJ 07748

MSK کی تمام لوکیشنز کی ہدایات اور پارکنگ کی معلومات کے لئے

www.msk.org/parking ملاحظہ کریں

وہاں کیا ہوگا

آپ کے پینچن کے بعد

آپ کے پینچن کے بعد، آپ کو اپنا نام اور نام کی جگہ اور تاریخ پیدائش کئی بار

بتانے کو کہا جائے گا یہ آپ کے تحفظ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی

جیسے نام کے لوگوں کا طبی عمل اسی دن ہو رہا ہو

اسپتال کا گاؤن پہننے کے بعد، آپ اپنے نرس سے ملیں گے اور آپ کی ایک رگ، عموماً آپ کے ہاتھ یا بازو کی رگ، میں انٹراوینس (IV) کیتھیٹر لگائے گا۔ IV آپ کو طبی عمل کے دوران اینسٹھیسیا (آپ کو سلائے والی دوا) دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کے طبی عمل سے پہلے آپ کو IV کے ذریعے مائع جات بھی دیے جاسکتے ہیں۔

اپنے طبی عمل سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے اور طبی عمل کی وضاحت کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔

آپ کے طبی عمل کے دوران

جب آپ کے طبی عمل کا وقت ہو جائے گا، تو آپ طبی عمل کے کمرے میں جائیں گے اور آپ کو معائنہ کی ایک ٹیبل پر لٹا دیا جائے گا۔ آپ کا ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ آپ کے دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی کے لیے ایک ایکوئپمنٹ تیار کرے گا۔ آپ کو ایک پتلی ٹیوب کے ذریعے آکسیجن دی جائے گی جو آپ کی ناک کے نیچے لگی ہوگی۔ آپ کے دانتوں کے اوپر ایک ماؤتھ گارڈ بھی لگا ہوگا تاکہ دانت محفوظ رہیں۔

آپ کو اپنے IV کے ذریعے اینسٹھیسیا دیا جائے گا، جس سے آپ سو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ سوئیں گے، آپ کا ڈاکٹر آپ کے منہ کے ذریعے اینڈوسکوپ داخل کر دے گا۔ آپ کی غذائی نالی کے نیچے آپ کے معدے میں، اور آپ کی چھوٹی آنت میں چلا جائے گا۔ آپ کا ڈاکٹر ٹشو کے نمونے لینے کے لیے بایوپسیز کرے گا، اگر ضرورت ہوئی تو پھر وہ اینڈوسکوپ نکال لے گا۔

آپ کے طبی عمل کے بعد

آپ کا نرس آپ کے دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی جاری رکھے گا۔ آپ کو گلے میں خراش محسوس ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو، تو یہ 1 سے 2 دن

میں ختم ہو جائے گی۔

جب آپ پوری طرح جاگ جائیں گے، تو آپ کا نرس آپ کا IV نکال لے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ گھر روانہ ہوں، آپ کا نرس آپ کو ڈسچارج کی ہدایات بتائے گا۔

گھر پر

اپنے طبی عمل کے 24 گھنٹے (1 دن) بعد تک کوئی الکوحل والے مشروبات نہ پیئیں۔

اپنے معالج کو کب کال کی جائے

اگر آپ کو درج ذیل میں سے کسی علامت کا سامنا ہو تو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو کال کریں:

- 101 (38.3°C° F) یا اس سے زیادہ کا درجہ حرارت
- سینے میں درد یا سانس میں تنگی (سانس مشکل سے آنا)
- آپ کے پیٹ (معدے) میں شدید درد، سختی، یا سوجن
- آپ کی قے (الٹی) میں خون آنا
- کمزوری، بے ہوشی کی کیفیت، یا دونوں
- کوئی بھی دیگر سوالات یا خدشات

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

مزید وسائل کے لیے، www.mskcc.org/pe پر جا کر ہماری ورچوئل لائبریری تلاش کریں

About Your Upper Endoscopy - Last updated on July 1, 2024
تمام حقوق Memorial Sloan Kettering Cancer Center کے زیر ملکیت اور محفوظ ہیں