

مریض اور نگران کے لیے تعلیم

پیڈیاٹرک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹس کے دوران استعمال ہونے والی عام ادویات

یہ معلومات ان ادویات کی فہرست کے بارے میں ہیں جو پیڈیاٹرک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ سے پہلے، اس کے دوران یا بعد میں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کا ہیلتھ کیئر پرووائیڈر آپ سے ان ادویات کے بارے میں بات کرے گا جو آپ لے رہے ہیں، بشمول ادویات کے نام اور آپ کے لیے انہیں لینا کیوں ضروری ہے۔ اس ریسورس میں، لفظ ”آپ“ کا مطلب آپ یا آپ کا بچہ ہے۔

سپلیمنٹس

- فولک ایسڈ: وٹامن جو آپ کے جسم کو خون کے عام خلیات بنانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔
- پوٹاشیم کلورائیڈ / پوٹاشیم فاسفورس: پوٹاشیم سپلیمنٹ مسلز (بشمول آپ کا دل) کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کے جسم کو پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔
- میگنیشیم آکسائیڈ / میگنیشیم سویا: میگنیشیم سپلیمنٹ آپ کے دل کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے میگنیشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ملٹی وٹامن: وٹامن سپلیمنٹ جس میں آئرن بھی شامل ہو سکتا ہے۔
- وٹامن K: وٹامن جس کی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ

کا خون جم سکے

GVHD کی روک تھام

یہ ادویات گرافٹ ویرس ہوسٹ ڈیزیز (GVHD) کی روک تھام یا علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی مثالوں میں شامل ہیں:

● (CellCept) mycophenolate mofetil (®)

● (Neoral) cyclosporine (®)

● (Prograf) tacrolimus (®)

● (Rapamune) sirolimus (®)

● methotrexate (کم خوراک کے ساتھ)

اینٹی وائرل

یہ ادویات وائرل انفیکشن (جیسے چکن پاکس اور شنگلز) کی روک تھام یا علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دیگر وائرل انفیکشن میں جو بعض اوقات ٹرانسپلانٹ کے دوران ہو جاتے ہیں سائٹومیگالو وائرس (CMV)، ہیومن ہرپس وائرس (HHV6)، اڈینو وائرس اور BK وائرس شامل ہیں۔ اس کی مثالوں میں شامل ہیں:

● (Zovirax) acyclovir (®)

● (Foscavir) foscarnet (®)

● (Cytovene) ganciclovir (®)

● (Vistide) cidofovir (®)

● (Prevymis) letermovir (®)

● (®valganciclovir (Valcyte

Antifungals اینٹی فنگلز

یہ ادویات فنگل انفیکشن کی روک تھام یا علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
اس کی مثالوں میں شامل ہیں:

● (®fluconazole (Diflucan

● (®amphotericin (AmBisome

● (®voriconazole (Vfend

● (®micafungin (Mycamine

● (®posaconazole (Noxafil

● (®isavuconazonium (Cresemba

متلی روکنے والی ادویات Antinausea

یہ ادویات متلی (ایسا محسوس ہونا کہ آپ قے کرنے والے ہیں) اور (قے) کی
روک تھام یا علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کی مثالوں میں شامل
ہیں:

● (®ondansetron (Zofran

● (®hydroxyzine (Vistaril

● (®metoclopramide (Reglan

● (®granisetron (Kytril

● (®lorazepam (Ativan

- (®dronabinol (Marinol
- (®fosaprepitant (Emend
- (®diphenhydramine (Benadryl

اینٹاسڈز Antacids

یہ ادویات معدے کی تیزابی رطوبت کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی مثالوں میں شامل ہیں:

- (®pantoprazole (Protonix
- (®lansoprazole (Prevacid
- (®ranitidine (Zantac
- (®omeprazole (Prilosec
- (®esomeprazole magnesium (Nexium

ہارمونز (خواتین کے لیے)

یہ ادویات آپ کے پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھانے کی صورت میں اندام زہانی سے خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کی مثالوں میں شامل ہیں:

- (®norgestrel (Ovral
- (®norgestrel and ethinyl estradiol (Lo-Ovral
- (®medroxyprogesterone acetate (Provera
- (®leuprolide (Lupron

(®medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

مزید وسائل کے لیے، www.mskcc.org/pe پر جا کر ہمارے ورچوئل
لائبریری تلاش کریں

Commonly Used Medications During Pediatric Stem Cell Transplants -

Last updated on December 12, 2022

تمام حقوق Memorial Sloan Kettering Cancer Center کے زیر ملکیت اور محفوظ
ہیں



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center