

אפט באנוצטע מעדיקאציע דורכאויס פעדיעטריק סטעם צעל טראנספלאנטס

די אינפארמאציע רעכנט אויס מעדיקאציעס וועלכע ווארן אפט גענוצט איידער, דורכאויס, אדער נאך א פעדיעטריק סטעם צעל טראנספלאנט. אייער העלטקעיר פראוויידער וועט רעדן מיט אייך וועגן די מעדיקאציעס וועלכע איר נעמט, אריינגערעכנט זייערע נעמען און וויאזוי איר דארפט זיי נעמען. אין דעם וועגווייזער, גייט די ווארט "איר" ארויף אויף אייך אדער אייער קינד.

סופלעמענטס

- פאליק עסיד (Folic acid): א וויטאמין וועלכע אייער קערפער דארף צו מאכן נארמאלע בלוט צעלן.
- פאטאסיום קלארייד (Potassium Chloride)/פאטאסיום פאספאראס (Potassium Phosphorus): א פוטאסיום סופלעמענט. אייער קערפער דארף פאטאסיום פאר אייערע מוסקלען (אריינגערעכנט אייער הארץ) צו ארבעטן ריכטיג.
- מאגניזיום אקסייד (Magnesium Oxide)/מאגניזיום סאו (Magnesium Soy): מאגניזיום סופלעמענטס. אייער הארץ דארף מאגניזיום צו ארבעטן ריכטיג.
- מולטיוויטאמין: א וויטאמין סופלעמענט וועלכע קען יא אדער נישט ענטהאלטן אייראן.
- וויטאמין K: א וויטאמין וועלכע אייער קערפער דארף כדי אייער בלוט זאל קענען קלאט'ן.

GVHD פארמיידונג

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען גרעפט-קעגן-האוסט קראנקהייט (GVHD). ביישפילן רעכענען אריין:

- מייקאפענאלעיט מאפעטיל (CellCept®)
- סייקלאספארין (Neoral®)

- טאקראלימאס (®Prograf)
- סיראלימאס (®Rapamune)
- מעטאטרעקסעיט (ביי א נידריגע דאזע)

אנטיוויראלס

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען וויראל אינפעקציעס (ווי טשיקען פאקס און שינגעלס). אנדערע וויראל אינפעקציעס אפט געזען דורכאויס א טראנספלאנט רעכענען אריין סיטאמעגאלאווירוס (cytomegalovirus, CMV), יומען הירפס ווירוס (HHV6), אדענאווירוס, און BK ווירוס. ביישפילן רעכענען אריין:

- אסיקלאוויר (®Zovirax)
- פאסקארנעט (®Foscavir)
- גאנסיקלאוויר (®Cytovene)
- סידאפיוויר (®Vistide)
- לעטערמאוויר (®Prevymis)
- וואלגאנסיקלאוויר (®Valcyte)

אנטיפאנגעלס

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען פאנגעל אינפעקציעס. ביישפילן רעכענען אריין:

- פליוקאנאזאוויל (®Diflucan)
- אמפאטעריסין (®AmBisome)
- וואריקאנאזוויל (®Vfend)
- מיקאפאנגין (®Mycamine)
- פאסאקאנאזוויל (®Noxafil)
- איסאוואקאנאזווין (®Cresemba)

אנטיאיבלונג

די מעדיקציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען איבלונג (געפילן פון ברעכן) און ברעכן. ביישפילן רעכענען אריין:

- אנדאנסעטראן (®Zofran)
- היידראקסיזין (®Vistaril)
- מעטאקלאפראמיד (®Reglan)
- גרעניסעטראן (®Kytril)
- לארעזעפעם (®Ativan)
- דראנאבינאל (®Marinol)
- פאסאפרעפיטענט (®Emend)
- דיפענהיידראמין (®Benadryl)

אנטאסידס

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמינערן בויך עסיד ארויסלאזונגען. ביישפילן רעכענען אריין:

- פאנטאפראזאול (®Protonix)
- לאנסאפרעזאול (®Prevacid)
- רעניטידיין (®Zantac)
- אומפרעזאול (®Prilosec)
- עסאמעפראזאול מאגניזיאם (®Nexium)

הארמאנען (פאר נקיבות)

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן וועדזשינעל בלוטיגונג ווען אייער פלעיטלעט צאל איז זייער נידריג. ביישפילן רעכענען אריין:

- נארדזשעסטרעל (®Ovral)
- נארדזשעסטרעל און עטיניל עסטראדיאל (®Lo-Ovral)
- מעדראקסיפראדזשעסטרעל אסיטעיט (®Provera)
- ליופראלייד (®Lupron)

• מעדראקיפראדזשעסטראן אסיטעיט (®Depo-Provera)

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call .212-639-2000

פאר מער ריסאורסעס, באזוכט www.mskcc.org/pe צו דורכקוקן אונזער ווירטואלע לייברערי.

Commonly Used Medications During Pediatric Stem Cell Transplants - Last updated on December 12, 2022

אלע רעכטן ווערן געאייגנט און רעזערווירט דורך מעמאריעל סלאון קעטערינג קענסער צענטער



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center