



患者及照护者教育

关于连续上肢神经阻滞导管

本信息介绍了连续上肢神经阻滞导管。其中解释了该导管是什么、如何运作以及置入导管后的预期情况。

关于神经阻滞导管

神经阻滞是指使用局部麻醉剂阻断某组神经的疼痛感。局部麻醉剂是一种用于麻醉身体某个部位的药物。

连续神经阻滞通过一根与泵相连的导管（柔性细管）给药。连续神经阻滞可持续数天，帮助您减轻术后疼痛。

您的麻醉师将调整您的麻醉泵，为您提供适量的局部麻醉剂。麻醉师是受过特殊医学培训的医生，可以在手术前、手术期间和手术后帮助您止痛。您所需要的药物剂量可能比正常情况更多或更少，具体取决于您术后的疼痛程度。

连续上肢神经阻滞可阻断上肢（肩膀、手臂或手部）神经的痛感。局部麻醉剂通过放置在颈部附近的神经阻滞导管到达这些神经。

连续上肢神经阻滞可以消除大部分疼痛，但无法完全消除疼痛。在接受神经阻滞治疗期间，您可能还需要服用止痛药。

手术后可能发生的情况

神经阻滞导管将在手术期间置入。手术后，肩膀、手臂或手部有麻木感是正常的。

进行手术一侧的面部或颈部可能會有麻木感。您還可能會出現聲音嘶啞、眼瞼下垂、瞳孔縮小或鼻塞等情況。這些都是局部麻醉劑導致的正常現象，會在取出神經阻滯導管後消失。

術中使用的強效局部麻醉劑會在術後約 8 至 16 小時失效。屆時，您將能更輕鬆地活動肩膀、手臂或手部。在恢復感覺的過程中，您可能會感到些許不適。護士會調整您的麻醉泵，通過神經阻滯導管為您進行局部麻醉。他們還可能會為您提供止痛藥，幫助您緩解任何不適。

術後第一晚睡覺前，讓護士為您提供止痛藥。這將有助於防止您在麻木感消失後痛醒。

置入神經阻滯導管後的預期情況

- 神經阻滯導管周圍可能會滲出一些液體。這些液體是局部麻醉劑。這是正常現象，並不意味著導管不起作用。如果發現神經阻滯導管漏液，請告知您的護士。
- 您的神經阻滯導管可能會意外脫落或被拔出。如果發生該情況，請告知您的護士。請勿丟棄您的導管。
- 切記時刻注意您的肩膀、手臂或手部的位置。由於使用了局部麻醉劑，您將無法完全感覺到它們。請避免這些部位受傷。如果護士為您提供了懸帶，請始終將手臂放在懸帶中，接受物理治療時除外。

- 如果感觉肩膀、手臂或手部完全麻木，请告知您的护士。您的泵可能需要关闭一段时间。在您的手臂恢复知觉后，即可重新将泵打开。

何时电话联系您的医疗保健提供者

如果出现以下任何一种情况，请您联系您的医疗保健提供者：

- 呼吸困难或胸痛。
- 身体任何部位出现皮疹或荨麻疹。
- 嘴巴周围产生麻木感。
- 口腔中有金属味。
- 耳鸣。
- 感觉头昏眼花。
- 意识模糊。
- 口齿不清。
- 身体任何部位抽搐。
- 癫痫发作（出现无法控制的颤抖或僵硬）。

联系信息

如果您有任何疑问或担忧，请致电 212-639-6851 联系麻醉疼痛服务。您可在周一至周五上午 9 点至下午 4 点联系到工作人员。下午 4 点以后和周末以及节假日，请致电 212-639-2000，要求值班的麻醉疼痛科医生接线。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Continuous Upper Extremity Nerve Block Catheter - Last updated on April 2, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利