



患者及照护者教育

## 关于阴茎超声检查

本信息介绍了阴茎超声检查前和检查期间的预期情况。

超声检查是一种成像检查。该检查利用声波来生成身体内部的图像。

阴茎超声检查可显示进出阴茎的血流情况。如果您有阴茎弯曲，这项检查还可以测量弯曲度。这些都有助于医生决定哪种治疗方法最适合您。

超声检查时，您的伴侣或其他家庭成员不得在场。超声检查后，在医生与您讨论检查结果和治疗计划时，他们可以陪在您身边。

### 预约阴茎超声检查之前

- 如果您正在服用降压药，请确保在超声检查当天服用。如果血压过高，我们需要重新安排超声检查时间。
- 如果您服用西地那非 (Viagra<sup>®</sup>)、阿伐地尔 (Stendra<sup>®</sup>) 或伐地那非 (Levitra<sup>®</sup>) 或他达拉非 (Cialis<sup>®</sup>)，超声检查预约当天请勿服用。
- 如果您使用阴茎注射剂 (Trimix、Bimix 或 papaverine)，超声检查预约前 24 小时 (1 天) 和预约后 24 小时内请勿注射。
- 我们建议您在超声检查当天穿宽松的裤子。

## 阴茎超声检查预约期间

阴茎超声检查需要在阴茎硬性勃起时进行。按时到达预约地点非常重要。这样可以留出足够时间来确保您的阴茎硬性勃起。

预约期间，您可能会见到执业护理师 (NP)、注册护士 (RN)、进修医生（医生），或三者皆有。这些医疗保健提供者中可能有 1 位或多位是女性。

### 超声检查前

NP 或 RN 会在您的阴茎轴一侧注射药物。他们会使用一根短小的针头。可能会有轻微不适，但应该不会感到疼痛。他们注射的药物将帮助您勃起。

注射完毕后，NP 或 RN 将离开诊室。房间里的 iPad 上会有色情视频。您可以根据自身意愿进行观看，但不作强制要求。

### 超声检查期间

当您准备好后，会有一名进修医生进入房间。首先，他们会检查您勃起的硬度。如果需要更硬，他们会向您的阴茎轴注射更多药物。

接下来，进修医生会在您的阴茎上涂抹一种特殊的超声凝胶。他们会在您的阴茎外侧移动一种称为“探针”的小型器械。如果您有阴茎弯曲，或其他可能患有佩罗尼氏病的体征，则他们会对您的阴茎进行测量。

### 超声检查后

阴茎超声检查后，您需要在办公室留观至少 30 分钟。这样可以留

出时间，确保您的勃起完全消失。如果勃起不能自行消失，您将需要药物来帮助消除勃起。NP 或进修医生将为您的阴茎轴注射 1 次或多次逆转注射药物。

在此期间，医生会向您说明超声检查的结果。他们还会与您讨论您的治疗计划。

整个预约就诊过程大约需要 60 到 90 分钟。

## 阴茎超声检查后

如果您使用阴茎注射剂（Trimix、Bimix 或 papaverine），超声检查后 24 小时内请勿注射。

## 联系信息

如果您有任何疑问，请您直接联系您的医疗团队成员。周一至周五早上 8:00 至下午 5:00，您可以通过我们的患者门户 MyMSK 与他们取得联系。将在 24 小时内给予答复。如需了解更多信息（包括 MyMSK 注册说明），请阅读 *Communicating With Your Care Team: When to Call or Use MyMSK* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/communicating-healthcare-team-mysk](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/communicating-healthcare-team-mysk))。

如果您需要在下午 5:00 之后、周末或节假日联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

.

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

About Your Penile Ultrasound - Last updated on March 9, 2022

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利