

患者及照护者教育

关于 Xofigo® 治疗

本信息将帮助您为即将在 MSK 进行的 Xofigo 治疗做好准备。

关于 Xofigo

Xofigo 是一种用于治疗已扩散至骨骼的前列腺癌的药物。 它有助于预防癌症引起的骨骼相关症状。

Xofigo 是一种放射性靶向治疗药物。 这意味着它由 2 个主要部分组成: 放射性部分和肿瘤靶向部分。

- 肿瘤靶向部分可使药物仅对抗肿瘤细胞,而非正常细胞。 这将 有助于防止药物损害身体的健康部位。
- 放射性部分则利用辐射(能量波)损伤并杀死肿瘤细胞。

Xofigo 通过静脉 (IV) 输注给药。 静脉注射是指通过静脉管路将药物注入到静脉内。

制定 Xofigo 治疗计划

在 Xofigo 预约之前,您将接受分子成像和治疗服务 (MITS) 医疗保健提供者的会诊。MITS 有时称为核医学服务。 预约就诊前,您可能需要接受血液检查。 如果需要的话,MITS 工作人员将为您提供更多信息。

在预约期间,您的 MITS 提供者将询问您的病史信息。 此外,他们还会与您讨论 Xofigo 治疗的目标。 医疗保健提供者将根据您的病史和血液检查结果,判断 Xofigo 治疗是否适合您。

医疗保健提供者决定开始接受治疗对您是安全的后,他们将会讨论副作用。 他们还会向您提供关于 Xofigo 治疗计划安排的信息。


如果您正在接受其他前列腺癌治疗(如化疗、放疗或其他类型的放射性靶向治疗),您可能需要在 Xofigo 治疗前和治疗期间停止这些治疗。 如有需要,您的医疗保健提供者将为您提供更多相关信息。

Xofigo 治疗计划安排

Xofigo 治疗包括 6 次单独注射,每次间隔 4 周。 您的末次 Xofigo 注射将在首次注射后 20 周(约 4.5 个月)进行。 您将前往 MSK 接受每次注射。

您还需要在每次注射前 2-3 天接受血液检查。 您可以在离您最近的 MSK 办公点接受这些血液检查。

以下时间表展示了您的 Xofigo 治疗计划安排。



Xofigo injection every 4 weeks for 20 weeks

Blood test 2 to 3 days before each injection

图 1. Xofigo 治疗计划安排

关于 Xofigo® 注射预约

前往何处

您的 Xofigo 注射将在 MITS 治疗室进行。 为抵达治疗室,请通过位于第一大道(东 67 街与东 68 街之间)1250 号的入口进入医院。 随后在大堂的安保服务台旁边左转。 上楼梯,并在楼梯顶端的接待处办理登记手续。 您可以在等候区等待。 随后工作人员将过来带您到 MITS 治疗室。

如果您需要使用电梯而不是楼梯,或者如果您有疑问,请向保安求助。

可能发生的情况

您的 Xofigo 注射将在 MITS 治疗室进行。 为抵达治疗室,请通过位于第一大道(东 67 街与东 68 街之间)1250 号的入口进入医院。 随后在大堂的安保服务台旁边左转。 上楼梯,并在楼梯顶端的接待处办理登记手续。 您可以在等候区等待。 随后工作人员将过来带您到 MITS 治疗室。

如果您需要使用电梯而不是楼梯,或者如果您有疑问,请向保安求

助。

辐射安全注意事项

Xofigo 输注后,您的身体会具有辐射性。 辐射安全专员是辐射安全方面的专家。 在您结束注射预约前,他们将告知您辐射安全注意事项。 他们还将为您提供一份需要在家中遵循的书面指南。

请遵循以下辐射安全措施和辐射安全专员的指示,以避免他人暴露 于辐射中。

在每次 Xofigo 注射后 1 周内,请注意:

- 如厕时保持坐姿。请勿使用小便池。
- 如厕后请冲厕所,并用肥皂和水冲洗干净双手。
- 如果您的床单或衣服被血液、尿液或粪便污染,请将其与其他 衣服分开清洗,并确保充分冲洗。
- 在擦拭血液、尿液、粪便和呕吐物以及处理被污染的衣服时, 请佩戴医用手套。

注射 Xofigo 后与他人接触是安全的,包括孕妇和儿童。 您可以与 他们共度时光,拥抱并触摸他们。

某些安全设备(如机场内或隧道外的)可以检测到非常少量的辐射。 辐射安全专员会给您一张钱包卡,上面写着您已服用放射性药物。 该卡将显示,您在治疗后 1 个月内可能会释放少量辐射。 如果您在检查站被执法人员拦住,请出示这张卡片。

如果您对辐射安全有任何疑问,请在周一至周五上午9:00至下午

5:00 致电 212-639-7391 联系我们。

Xofigo 注射预约后

请遵循辐射安全专员为您提供的辐射安全指南。

请在每次注射后饮用大量液体。 这将有助于 Xofigo 的辐射更快地 排出您的身体。 在洗手间内清洁或冲洗您的体液(如尿液)时, 请务必遵循辐射安全指南,这一点非常重要。

在 Xofigo 治疗期间(从首次注射至末次注射后 6 个月),请注意:

- 每次进行性生活时请使用避孕措施。
- 请勿使您的伴侣怀孕。
- 请勿让您的伴侣接触到您的精液。

如果您有任何问题,请咨询您的 MITS 医疗保健提供者。



联系信息

如果您有任何问题或担忧,请致电分子成像和治疗服务。

- 周一至周五上午 9:00 至下午 5:00,请致电 212-639-3146, 然 后请分子成像和治疗服务护士接听电话。
- 下午 5:00 后或在周末和节假日,请致电 212-639-2000, 然后 请分子成像和治疗服务值班专科进修医生接听电话。

有关更多资源,请访问 www.mskcc.org/pe,在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Xofigo® Treatment - Last updated on May 9, 2023 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利