



患者及照护者教育

# 接受替索单抗 (Tivdak™) 治疗期间的眼部护理

本信息介绍了在 MSK 接受替索单抗治疗期间如何护理眼部。

替索单抗是一种用于治疗宫颈癌的药物。这种药物会引起角膜变化（眼球表面的变化）。它会导致：

- 干眼症。
- 眼红。
- 眼睛受到刺激。
- 角膜溃疡（眼球表面的溃疡）。会导致视力丧失。
- 视线模糊。
- 眼镜需求发生变化。

眼部问题可能会导致严重后果。如果您在治疗期间开始出现视力变化或眼部问题，请告知您的 MSK 医疗团队和/或眼科医生。如果您已经出现视力变化或眼部问题，若情况恶化请告知他们。

## 为治疗做好准备

替索单抗通过多次输液给药。输液是指在一段时间内通过静脉将药物注入您的静脉中。我们可能会为您置入一根静脉注射 (IV) 导

管以便输液。

您需要完成以下事项，为第一次替索单抗输注做好准备。

## 看眼科医生

您的 MSK 医疗保健提供者会将您转诊至眼科医生处。眼科医生将对您的眼睛进行检查，以确保您可以安全地开始治疗。

在下列情况下，您也必须看眼科医生：

- 每次接受替索单抗输注前。
- 开始出现眼部问题。
- 眼部问题加重。

开始治疗后，请勿佩戴隐形眼镜，除非您的医疗保健提供者建议您这样做。您的医疗团队成员将告知您何时可以安全地佩戴隐形眼镜。

## 领取处方滴眼液

您的医疗保健提供者将为您开具 3 种类型的滴眼液。

- 含有血管收缩剂（溴莫尼定）的滴眼液。此类滴眼液会使您眼睛里的血管收紧（收缩）。这会有助于减少对眼睛的副作用。
- 类固醇（地塞米松）滴眼液。此类滴眼液有助于减少眼部炎症（例如发红），减轻对眼睛的刺激。
- 润滑滴眼液（不含防腐剂的人工泪液）。此类滴眼液有助于润滑眼球。这有助于预防和管理眼部刺激及干眼症。

滴眼液将有助于降低您在治疗期间出现眼部问题的风险。使用滴眼液时，请遵循医疗保健提供者的指导说明。每次接受替索单抗输注时，请携带您的滴眼液。

## 购买冰敷眼罩

请购买 3 个冰敷眼罩，在接受替索单抗输注期间使用。您可以在线购买或前往当地超市或药房购买。眼罩必须能够完全遮住您的眼睛。请勿购买会露出眼睛的眼罩（见图 1）。

如果您无法购买冰敷眼罩，您可以使用冰袋代替。在输液期间，我们会向您提供一个冰袋。




图 1. 购买能够完全遮住眼睛的眼罩

## 治疗期间

从第一次接受替索单抗输注开始：

- 每天根据需要使用润滑滴眼液。请遵循滴眼液瓶身上的用法说明。完成最后一次替索单抗输注后，请继续使用 30 天。

- 如果您发现视力有任何变化，请告知您的 MSK 医疗团队和/或眼科医生。
- 请注意滴眼液的余量，以免用完。如果滴眼液快用完，请告知您的医疗保健提供者。他们将重新为您开具处方。

## 每次接受替索单抗输注当天

每次输注时，请携带以下物品：

- 含有血管收缩剂的滴眼液。
- 类固醇滴眼液。
- 润滑滴眼液。



如果您在预约时未携带上述所有物品，您将无法接受替索单抗输注。

如果您已经购买了冰敷眼罩，请记得也带上。您需要提前将其放入家中的冰箱进行冷冻。将它们放在装满冷冻冰袋的小型冷藏箱（例如保温午餐盒）中并携带至接受替索单抗输注的场所。如果您没有小型冷藏箱或冰袋，请在第一次输注前购买。

## 输注前

- 输注开始前约 10 分钟，将冰敷眼罩或冰袋敷在眼睛上。
- 输注即将开始前，使用含有血管收缩剂的滴眼液。每只眼睛各滴 3 滴。护士将为您提供帮助。

- 输注即将开始前，使用类固醇滴眼液。每只眼睛各滴 1 滴。护士将为您提供帮助。

如果您的医疗保健提供者为您提供其他指导说明，请遵循相应说明。

## 输注期间

- 整个输注期间都要将冰敷眼罩或冰袋敷在眼睛上。当冰敷眼罩或冰袋开始达到室温或融化时，更换为另一个。

## 输注后

- 完成输注后，将冰敷眼罩或冰袋敷在眼睛上约 20 分钟。
- 在当天剩余时间内，每隔几个小时再使用 2 次类固醇滴眼液。每次每只眼睛各滴 1 滴。
- 根据需要使用时使用润滑滴眼液。使用类固醇滴眼液和润滑滴眼液应间隔 5 分钟。

如果您的医疗保健提供者为您提供其他指导说明，请遵循相应说明。

## 每次接受替索单抗输注后 1 天

- 当天每隔几个小时再使用 3 次类固醇滴眼液。例如，您可以在早上、中午左右和晚上使用。每次每只眼睛各滴 1 滴。
- 根据需要使用时使用润滑滴眼液。使用类固醇滴眼液和润滑滴眼液应间隔 5 分钟。

如果您的医疗保健提供者为您提供其他指导说明，请遵循相应说

明。

## 每次接受替索单抗输注后 2 天

- 当天使用类固醇滴眼液 3 次（早上、中午和晚上）。每次每只眼睛各滴 1 滴。
- 根据需要使用润滑滴眼液。使用类固醇滴眼液和润滑滴眼液应间隔 5 分钟。

如果您的医疗保健提供者为您提供其他指导说明，请遵循相应说明。

## 接受替索单抗输注之间

根据需要使用润滑滴眼液。

大多数人每 3 周左右接受一次替索单抗输注。每次输注前 7 天内都需要前往眼科医生处就诊。眼科医生将检查您的眼睛并帮助您解决遇到的任何问题。如果您在每次接受替索单抗输注之前没有前往眼科医生处就诊，您无法进行输注。

请记住，如果您开始出现任何眼部问题，请告知您的 MSK 医疗团队和/或眼科医生。同时，告知他们您的眼部问题是否加重。

- 肿胀
- 发红
- 眼睛痒
- 眼睛疼痛
- 视线模糊
- 泪液分泌增加
- 干眼症
- 对光敏感
- 严重的视力丧失

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

How to Care for Your Eyes During Your Treatment with Tisotumab (Tivdak™) - Last updated on March 31, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利