



患者及照护者教育

关于经皮内镜胃造口 (PEG) 引流管置入术

本信息将帮助您为在 MSK 进行的经皮内镜胃造口 (PEG) 引流管置入术做好准备。

PEG 是一根插入胃部，用于排出胃液的引流管。有助于缓解胃阻塞或肠梗阻引起的恶心和呕吐，从而让您感觉更加舒适。置管在内镜检查期间进行。如需了解更多信息，请参阅本资源“预期情况”部分。

置入 PEG 引流管后，您便可享受饮食。您将可以摄入液体、进食软食或经搅拌机混合的食物。但这些食物和液体仅能为您提供一小部分营养。这是因为您摄入的大部分食物或液体都会通过引流管流入引流袋。您的医生或护士将与您讨论如何满足您的营养需求。

医疗程序前 1 周

询问用药情况

您可能需要在医疗程序前停用某些药物。我们在下面列举了一些常见的例子。

- 如果您正在服用稀释血液的药物，请询问为您开具处方的医生应该何时停止服用这些药物。这类药物包括华法林

(Coumadin[®])、达肝素 (Fragmin[®])、肝素、亭扎肝素 (Innohep[®])、依诺肝素 (Lovenox[®])、氯吡格雷 (Plavix[®]) 和西洛他唑 (Pletal[®]) 等。

- 如果您使用胰岛素或其他治疗糖尿病的药物，您有可能需要改变剂量。请询问为您开具糖尿病药物处方的医生，在硬膜外类固醇注射当天早晨您应该怎么做。

如有需要，可以请医生出具书面文件。

如果您体内植入有自动植入式心脏复律除颤器 (AICD)，您需要请您的心脏科医生在您接受医疗程序前开具许可函。

安排人接您回家

疗程后请务必确保有一名负责任的照护者接您回家。负责任的照护者必须能够帮助您安全回到家中。如果他们有任何问题，应能够联系您的医疗团队。请务必在疗程开始前将此事安排好。

如果没有负责任的照护者接您回家，您可以致电以下服务机构。他们会安排人送您回家。此项服务需要付费，并且您需要提供交通工具。您可以乘坐出租车或使用汽车服务，但必须保证有一个负责任的照护者陪同。

纽约的服务机构

VNS 健康：888-735-8913

Caring People：877-227-4649

新泽西的服务机构

Caring People：877-227-4649

医疗程序前 3 天

您会接到内镜护士的电话。他们将与您一起查看本资源中的说明，并询问您关于病史的问题。护士也会检查您的药物，并告诉

您在医疗程序当天的早晨该吃哪种药。

医疗程序前一天

请注意您的手术时间

在手术前一天的下午 2 点后，工作人员将打电话给您。如果您的手术安排在周一，他们会在周五提前致电联系您。如果您在晚上 7:00 前未接到电话，请致电 212-639-5014。

工作人员将告知您到医院进行该手术的时间。他们还会提醒您接受手术的地点。

如果您因任何原因需要取消医疗程序，请致电为您安排该程序的医生。

进食指导说明



手术前的午夜（凌晨 12 点）后请停止进食。包括硬糖和口香糖。

如果医疗保健提供者告知您在午夜之前停止进食，请遵照其指示。有些人需要在手术前禁食（不吃东西）更长时间。

医疗程序当天

进食指导说明



手术前的午夜（凌晨 12 点）后请停止进食。包括硬糖和口香糖。

如果医疗保健提供者告知您在午夜之前停止进食，请遵照其指示。有些人需要在手术前禁食（不吃东西）更长时间。

注意事项

- 请喝几口水送服医生指示您在医疗程序当天早上服用的药物。
- 请勿使用任何乳液、乳霜、粉末制品、除臭剂、化妆品或香水。
- 请取下所有首饰，包括身体穿孔。
- 请将所有贵重物品，如信用卡和珠宝首饰，留在家中。
- 如果您平时戴隐形眼镜，请换上镜框眼镜。

来医院时需随身携带的物品

- 您居家服用的药物清单，包括贴片和药膏。
- 治疗您呼吸问题的药物（如吸入器）、治疗胸痛的药物或两者兼有。
- 带上眼镜盒
- 您的医疗护理委托书（如果您已完成）

前往何处

您将在以下两个地点中的一个接受医疗程序：

- David H. Koch 中心
东 74 大街 530 号
纽约，邮编 NY 10021
请乘坐电梯至 8 楼。

- Memorial Hospital (MSK 主医院) 的内镜室

约克大道 1275 号 (东 67 大街与东 68 大街之间)

纽约, 邮编 NY 10065

请乘坐 B 电梯至 2 楼。右转，通过玻璃门进入内窥镜/外科日间
医院手术室。

预期情况

当您到达医院后，医生、护士和其他工作人员会多次要求您陈述和
拼写出您的姓名和出生日期。这是为了保障您的安全。因为姓名
相同或相似的患者可能会在同一天接受医疗程序。

医生将向您解释医疗程序，并回答您可能问及的问题。他们将要
求您签署一份知情同意书。

当您接受该医疗程序时，您将被带入手术室，医生会帮您躺在检查
台上。您将被连接到设备上，以监测您的心脏、呼吸和血压。您
将通过鼻子接受供氧。我们还会在您的牙齿上放置口腔防护器，
保护您的牙齿。

将通过 IV 对您进行麻醉（使用药物使您入睡）。当您入睡之后，
医生会将内镜（末端带有摄像头的软管）通过您的口腔，沿着食道
(食管)，进入您的胃部。

医生会在您的腹壁皮肤上开一个小切口（手术切口），然后将引流
管穿过切口。引流管将伸出体外约 8 到 12 英寸并用小绷带敷料覆
盖以将其固定。

程序完成后，医生会取出内镜。他们会将 PEG 引流管的末端与引

流袋连接，用于排出胃液。

医疗程序完成之后

在医院时

您将在麻醉复苏室 (PACU) 中醒来。您的护士将监测您的体温、脉搏、呼吸和血压情况。他们还会检查引流管周围的绷带。您会一直待在 PACU 中，直至您完全清醒。

您的护士和营养师将告知您可摄入的食物种类。您的护士还会告诉您获取用品的地点及用品的使用方式：

- 清洁 PEG 引流管周围的皮肤。
- 冲洗引流管。
- 如果引流管堵塞，请及时处理。
- 护理和更换引流袋。
- 服用药物。
- 夹紧或盖住引流管。

在您出院回家之前，您的护士将向您提供以下用品，供您携至家中使用：

- 敷料更换用品：
 - 4 x 4 纱布
 - 胶带或 Cath-Secure[®]
 - 氧化锌 (Desitin[®]) 软膏

- 碘酒 (Betadine®) 棉签
- 1 套冲洗套件
- 2 个引流袋
- 2 枚管帽

医生也可能会开具其他止痛药，帮助您缓解切口部位的疼痛或不适感。

居家

- 您可能会感到咽喉部位疼痛。这是正常现象，1 - 2 天后就会好转。
- 在前 24 至 48 小时，您的切口部位可能会产生些许不适感。如果是这样，请遵医嘱服用止痛药。
- 您可以在医疗程序完成之后 48 小时淋浴。医疗程序完成之后 2 周内请勿进行盆浴或游泳。
- 您可以在医疗程序完成之后第二天恢复正常活动。

PEG 引流管的护理

PEG 引流管周围皮肤的护理

您需要护理 PEG 引流管周围的皮肤。请您遵循以下步骤。

每天检查引流管周围的皮肤是否发红、肿胀或流脓。如果出现其中的任何症状，请告诉您的医生或执业护理师 (NP)。

医疗程序完成之后前 2 天请遵照以下说明。

1. 取下旧敷料。
2. 每天用碘酒棉签清洁一次引流管周围的皮肤。
3. 涂抹氧化锌软膏。
4. 用 4 x 4 纱布覆盖切口部位。
5. 将引流管绕成圈，用胶带或 Cath-Secure 标签固定（见图 1）。




图 1. 固定引流管

医疗程序完成之后第三天，开始在每天淋浴时护理引流管周围的皮肤。

1. 淋浴前，先取下引流管周围的旧敷料。敷料上可能有液体或粘液的印迹。引流管周围可能有陈旧的血迹或痴皮。这是正常现象。
2. 用肥皂和水清洗引流管周围的皮肤，洗去任何液体或痴皮。轻轻拍干。

3. 淋浴结束后，涂抹氧化锌软膏。
4. 用 4 x 4 纱布覆盖置入部位。
5. 将引流管绕成圈，用胶带或 Cath-Secure 标签固定。

如果引流管阻塞或脱落，请用一块厚纱布覆盖开口。使用几块 4 x 4 纱布。随后立即致电您的医生。请勿进食或喝水。

将 PEG 引流管连接至引流袋

当您进食、饮水、感到恶心或睡觉时，应将 PEG 引流管连接至引流袋。其他时间无需连接。

如需将引流袋与 PEG 引流管连接，请从“绕圈”位置将其解开。取下引流袋导管的透明塑料盖，并将末端扭入 PEG 引流管中。

排空并清洁引流袋

在引流袋约装满 $\frac{1}{3}$ 至 $\frac{1}{2}$ 胃液时将其倒空，或每隔约 8 小时倒空一次。

如果您进食软食，请每天清洁一次引流袋。如果您不进食，请每 3 到 4 天清洁一次引流袋。为此，您需要：

1. 将 1 份白醋与 3 份冷水混合。
2. 将引流袋浸泡在该溶液中 10 至 15 分钟。让引流袋自然晾干。

在清洗和晾干引流袋期间盖住 PEG 引流管（不引流）可能会让您感到恶心或不适。如果遇到这种情况，请连接另一个引流袋。

PEG 引流管置管者饮食指南

医疗程序完成之后，您可以饮用清流质。清流质包括水、姜汁汽

水、苹果汁、咖啡、茶、肉汤、调味冰和果冻 (Jell-O[®]) 等。

饮食时需要坐直，让食物或液体排入引流袋。进食后至少保持坐姿 30 分钟。否则您可能会感到恶心。如果您感到恶心，请检查引流管是否扭结。如果是这种情况，请将其解开。这应该会让您感觉好些。如未扭结，请冲洗引流管。请参阅“冲洗 PEG 引流管”部分以获取相关说明。

当您能顺利饮用清流质后，如果您的医生同意，则可增加饮食量，以进行全流质饮食。如果尝试全流质饮食 2 天后未出现任何问题，即可开始进食软质或泥状食物。用搅拌机或食品加工机将食物打成泥状。仅经医生同意后才可按照以下步骤操作。

您的医生可能允许您进食非泥状食物。食用时，您必须将其切成小块并充分咀嚼。摄入量应极少。24 小时内不宜进食 4 杯以上食物或饮用 1 升 (33.8 盎司) 以上液体。每次摄入食物或液体时，您都会损失某些重要的营养物质。这是因为它们与食物或液体一起被排入了引流袋。

您摄入的部分食物或液体都会通过引流管流入引流袋。例如，如果您进食的是红色果冻，则排入引流袋中的排出物也将呈红色。即使没有进食，也会有胃液流入引流袋。胃液的颜色从绿色到暗黄色不等。

部分置管者在家中时都需要接受静脉 (IV，通过静脉注射) 补液，以免脱水。这可通过不同的导管和端口来完成，例如 Broviac 或 Hickman 导管、Mediport[®] 或经外周静脉置入中央静脉导管 (PICC)。如果您尚未置入其中一种导管，您的医生将在您住院期

间为您置入一种。如果您需要置入静脉导管，您的医生和护士将为您提供更多关于这方面的信息。

冲洗 PEG 引流管

您需要至少每天冲洗一次引流管。进食后，您或您的看护者应立即冲洗引流管。这是因为引流管可能会被食物堵塞。如果引流管被浓稠的胃液或粘液堵塞，也需要冲洗。如果您感觉恶心或有饱腹感，且坐起后未见好转，请冲洗您的 PEG 引流管。

如需冲洗引流管，请按照以下说明进行操作。

1. 准备好所需用品

- 60 mL 注射器，带导管头的注射器或 ENFit 注射器
- 在杯中加入 60 mL 生理盐水或水（室温或温热的普通自来水）
- 1 枚适配引流管的塑料盖帽
- 1 个干净的引流袋
- 纸巾

2. 用温水和肥皂清洗双手至少 20 秒或使用含酒精的洗手液进行清洁。

3. 将纸巾放在您的 PEG 引流管下，以吸收任何引流液。

4. 向注射器中注入 60 mL 水。

5. 夹紧 PEG 引流管。

6. 断开 PEG 引流管与引流袋的连接。

7. 将注射器插入 PEG 引流管开口。
8. 松开引流管，轻轻推动活塞，注入水。
9. 重新夹紧 PEG 引流管。
- .0. 取出注射器，将 PEG 引流管重新连接到引流袋上，松开并让其引流。

如果引流管未排出任何东西或您的恶心症状没有好转，请致电您的护士或医生。

PEG 引流管置管者服药指南

您可以口服药物。服药后，您必须将引流管夹闭至少 30 分钟。

何时电话联系您的医疗保健提供者

如果您出现以下情况，请立即致电您的医疗保健提供者：

- 胸痛或呼吸短促。
- 严重腹痛。
- 腹泻。
- 感到恶心或呕吐。
- 发热 $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ (38°C)。
- 任何头晕或虚弱。
- 流血不止，例如置入部位渗出鲜红色液体。
- 使用止痛药后切口部位的疼痛没有缓解。
- 冲洗 PEG 引流管时遇到困难。

- 置入部位周围的溢出液每天浸湿 5 块或更多的纱布垫。
- 引流管周围出现任何发红、肿胀或流脓迹象。
- PEG 引流管脱离。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About the Placement of Your Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) Tube for Drainage - Last updated on January 16, 2024
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利