



患者及照护者教育

# 针对成人癌症患者的肺炎双球菌疫苗接种指南

本文信息介绍了肺炎双球菌疫苗以及应在何时接种疫苗。

肺炎双球菌疫苗有助于预防肺炎双球菌感染。这种细菌可引发肺炎（肺部感染）、脑膜炎（大脑周围的膜发炎）以及其他可能导致死亡的严重疾病。

有 2 种类型的肺炎双球菌疫苗：Pneumovax<sup>®</sup>23 与 Prevnar 13<sup>®</sup>。这两种疫苗都可以预防多种细菌菌株，通过肌肉注射接种。

## 疫苗接种时间安排

如果您从未接种过肺炎双球菌疫苗，并且您已年满 18 周岁，我们建议您：

- 在您下次与您的医疗保健提供者预约就诊时接种 Prevnar 13。
- 接种 Prevnar 13 至少 8 周后接种 Pneumovax 23。

如果您已接种 Pneumovax 23，请等 1 年后再接种 Prevnar 13。

如果您对肺炎双球菌疫苗有任何问题，请咨询您的医疗保健提供者。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

Pneumococcal Vaccination Guidelines for Adults with Cancer - Last updated on September 28, 2021

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利