

患者及照护者教育

上消化道 (GI) 系列检查

本文将帮助您为即将在 Memorial Sloan Kettering (MSK) 进行的上消化道 (GI) 系列检查做好准备。

关于您的消化道

消化道是食物通过人体的路径。消化道的组成部分包括食管、胃和肠道(见图 1)。食管是指将食物和液体从口腔输送到胃部的管道。




图 1. 您的消化道

关于上消化道系列检查

上消化道系列检查是放射科医生拍摄一系列 X 光图像来观察食管、胃和部分小肠的检查。 放射科医生是接受过影像引导下医疗程序专门培训的医生。

上消化道系列检查有助于我们了解您出现症状的原因,包括:

- 吞咽困难
- 打嗝
- 胃灼热
- 胃痛
- 呕吐
- 体重减轻

硬膜外类固醇注射前一周

询问您的服药情况

您可能需要在医疗程序前停用某些药物。 您需要与您的医疗保健提供者讨论停用哪些药物对您是安全的。

糖尿病药物

您可能正在使用胰岛素或其他治疗糖尿病的药物。 请咨询开具药物处方的医疗保健提供者,了解您在医疗程序当天早晨应该怎么做。 您可能需要在医疗程序前改变剂量。

造影剂

您将在医疗程序期间使用造影剂。 造影剂是一种特殊的染料,用于让放射科医生更容易 观察到人体内脏器官的差异。

用于影像学检查的造影剂有多种类型。 上消化道系列检查使用的造影剂是钡剂(一种白垩状液体)或碘海醇(Omnipaque®,一种透明液体)。 放射科医生会告知您需要使用哪种造影剂以及如何使用。

如果您过去曾对造影剂产生反应,请告知您的放射科医生或医疗保健提供者。

医疗程序前一天

医疗程序前一天晚上可以吃晚餐。

医疗程序前饮食和进水指导

- 医疗程序前一天夜晚 12 点以后请勿进食。 包括硬糖和口香糖。
- 从午夜至您预定到达医院时间前的 2 小时,您可以饮用 总计 12 盎司的水(参见图)。
- 从预定到达时间前2小时开始,请勿进食或饮用任何东西。包括水。



医疗程序当天

注意事项

- 使用医生指示您在医疗程序当天早上使用的药物。 请喝几口水送服。 如果您需要在医疗程序后使用任何药物,请携带其前往医院。
- 请取下所有的首饰,包括身体穿孔饰品。
- 如果您习惯配戴隐形眼镜,如果可能,请换成镜框眼镜。如果您没有镜框眼镜,请携带您的隐形眼镜盒。

随身携带的物品

- □ 您在家使用的药物的清单,包括贴剂和乳膏。
- □ 治疗呼吸问题的药物(如吸入器)。
- □ 治疗胸痛的药物。
- □ 您需要在医疗程序后使用的任何药物。

泊车位置

MSK 的停车场位于约克大道和第一大道之间的东 66 大街。 如果您对价格有疑问, 请致电 212-639-2338

要到达停车场,请从约克大道转入东 66 大街。 停 车场离约克大道约四分之一街区,位于大街的右 侧(北侧)。 有一条行人隧道连接车库和医院, 您可以穿过其中。

在第一大道和第二大道之间的东 69 大街、约克大 道和第一大道之间的东67大街以及第一大道和第 二大道之间的东 65 大街还有其他停车场。



M = Memorial Sloan Kettering

前往何处

您将在东 67 大街 425 号(第一大街和约克大道之间)接受医疗程序。 这是 MSK 主楼的一 个侧门。 请乘 A 电梯到 2 楼。

预期情况

当您到达医院后,医生、护士和其他工作人员会多次要求您陈述和拼写出您的姓名和出生 日期。 这是为了保障您的安全。 姓名相同或相似的患者可能会在同一天接受医疗程序。

您将换上病号服并取下所有首饰和义齿。 放射科医生将为您介绍该医疗程序,并回答您 的问题。 您将获得造影剂。 造影剂可能是钡剂或碘海醇 (Omnipague),具体取决于您接 受检查的原因。 放射科医生会告知您饮下造影剂的时间和量。

您将在帮助下平躺在X光检查床上。放射科医生可以通过X光观察造影剂在您的食管、 胃和小肠中的移动情况。 我们可能会要求您变换体位或站立(如果可以)。 这有助于造 影剂流过您的肠道。

技术专家会在检查期间为您拍摄X光片。根据检查的原因,您可能需要多饮下一些造影 剂。 您需要等待造影剂到达放射科医生需要检查的身体部位。 然后,技术专家会再拍几 张 X 光片,每张间隔 30 分钟。

待放射科医生检查完所有 X 光片,您即可离院。

您的医疗程序需要约1至5小时。在某些情况下,您需要在12或24小时后再次进行X 光检查。 放射科医生会告知您是否还需要进行 X 光检查。

医疗程序完成之后

除非医疗保健提供者另有指示,否则您可以恢复正常饮食和活动。

如果您饮下的是钡剂,接下来的几天内粪便会呈白色,因为人体会排出钡剂。 钡剂可能会导致便秘,因此多喝水非常重要,这样有助于将钡剂排出肠道。 便秘指排便少于正常情况。

如果医疗程序后几天排便仍未恢复正常,请致电您的医疗保健提供者。 您可能需要使用泻药(如镁乳)或灌肠剂来清除所有钡剂。 泻药指帮助排便的药物。

结果

如果您未住院(门诊患者),可以在我们的患者门户网站 MyMSK 中查看您的检查结果。 检查结果会在 2 天内显示在您的账户中。 您也可以致电您的医疗保健提供者办公室来获 取检查结果。

如果您住院(住院患者),您会在医疗程序当天得到结果。 您可以向任何参与您的治疗的医疗保健提供者索要检查结果。

联系信息

如果您有任何问题或顾虑,请咨询放射科的医生、护士或医疗团队中的其他成员。 您可以在周一至周五早上 8:00 至晚上 8:00 致电 212-639-7298。

晚上 8:00 后或在周末和节假日,请致电 212-639-2000。 要求与您的医生的值班医生通话。

有关更多资源,请访问 www.mskcc.org/pe,在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Upper Gastrointestinal (GI) Series - Last updated on April 9, 2021 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利